

5-4-3-2-1 *technika oddolna*

W aktywacji kora przedczołowa jest offline. Werbalne „pomyśl o czymś bezpiecznym” nie dociera. Działa tylko podejście oddolne (ang. bottom-up) przez zmysły.

CZAS: 1–3 min na zastosowanie **REALIZACJA:** codzienna praktyka + interwencja kryzysowa

ŹRÓDŁO: Najavits (2002, *Seeking Safety*); van der Kolk (2014, *The Body Keeps the Score*); Ogden i in. (2006, *Sensorimotor Psychotherapy*); Levine (2010, *Somatic Experiencing*); Porges (2011, teoria poliwalgalna)

JAK UŻYWAĆ

W sekcji 01 — **technika 5-4-3-2-1** Najavits krok po kroku. W sekcji 02 — **dodatkowe techniki polisensoryczne**: praca z głosem (mruczenie, nucenie), orientacja przestrzenna, temperatura, ruch. Sekcja 03 — **twój zestaw narzędzi awaryjnych**: które techniki, w jakich sytuacjach, gdzie nosisz przypomnienie. Sekcja 04 — plan ćwiczeń *poza* kryzysem.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Polisensoryczne *grounding* to **najszybsza technika** wyjścia z retrospekcji (ang. *flashbacks*), dysocjacji i hiperpobudzenia. Aktywuje ścieżki sensoryczne **oddolnie** (ang. *bottom-up*) — wielokanałowa stymulacja zmysłów „przekierowuje” zasoby z ciała migdałowatego do kory przedczołowej i obszarów sensorycznych. Najavits (2002, *Seeking Safety*) sformułowała **5-4-3-2-1** — najpopularniejszą wersję: 5 rzeczy, które widzisz, 4 dźwięki, 3 rzeczy do dotknięcia, 2 zapachy, 1 smak. Uzasadnienie neurobiologiczne (van der Kolk, 2014, *The Body Keeps the Score*): trauma jest przechowywana w ciele i zmysłach, nie tylko w narracji werbalnej. Sama terapia werbalna często jest niewystarczająca w C-PTSD — potrzebna praca *oddolna* (od ciała do mózgu). Praktyczna implikacja: gdy klient jest w retrospekcji, terapeuta mówiący „*oddychaj głęboko*” lub „*pomyśl o czymś bezpiecznym*” nie dociera — kora myślowa jest *offline*, werbalne instrukcje *odgórne* (ang. *top-down*) nie są przetwarzane. Skuteczne jest natomiast bardzo konkretne: „*nazwij 5 rzeczy, które widzisz w pokoju... 4 dźwięki... 3 rzeczy, które dotykasz... 2 zapachy... 1 smak*”. Krótkie zdania, czasowniki w czasie teraźniejszym, konkretne sensoryczne polecenia. Dodatkowe techniki polisensoryczne: *praca z głosem* (Porges, 2011 — mruczenie, nucenie, śpiew tonizujący nerw błędny, gałąź brzuszna); *orientacja przestrzenna* (Levine, 2010 — powolne skanowanie pomieszczenia wzrokiem: mózg sprawdza, że jest bezpiecznie); *temperatura* (kontrast zimno/ciepło aktywuje układ somatosensoryczny); *ruch* (powolne, świadome ruchy przywracają poczucie sprawczości ciała). Ogden i in. (2006, *Sensorimotor Psychotherapy*): praca z ciałem w oknie tolerancji jest niezbędna w C-PTSD. Powtarzać aż klient wraca do teraźniejszości — zwykle 1–3 min.

01

Technika 5-4-3-2-1 (Najavits)

5

WIDZĘ

Nazwij głośno 5 rzeczy, które widzisz teraz. Kolory, kształty, faktury.

4

SŁYSZĘ

Nazwij 4 dźwięki, które słyszysz teraz. Daleki, bliski, ciągły, urywany.

3

DOTYKAM

Dotknij 3 rzeczy. Faktura, temperatura, twardość — nazwij głośno.

2

WĄCHAM

2 zapachy. Jeśli nic nie czujesz — przypomnij 2 znane.

1

SMAK

1 smak w ustach teraz. Lub łyk wody, kęs.

02 Dodatkowe techniki polisensoryczne

A · PRACA Z GŁOSEM (PORGES)

Mruczenie, nucenie, śpiew. Wibracja strun głosowych aktywuje gałąź brzuszną nerwu błędnego. Dźwięk „voo” przez 30–60 sek. Można cicho, w aucie, w łazience.

B · ORIENTACJA PRZESTRZENNA (LEVINE)

Powolne skanowanie pomieszczenia. Bez pośpiechu, oczami obróć głowę. Mózg sprawdza: „czy tu jest bezpiecznie?”. Trwa 30–60 sek. Sygnał dla układu nerwowego.

C · TEMPERATURA — KONTRAST

Zimna woda na twarz aktywuje odruch nurkowy (parasympatyk). **Ciepły koc**, kubek ciepłej herbaty w dłoniach. Kontrast aktywuje układ somatosensoryczny i szybko reguluje pobudzenie.

D · RUCH ŚWIADOMY (OGDEN)

Powolne, kontrolowane ruchy. Wstanie, rozciągnięcie, kilka kroków. Stopy świadomie na podłodze. Przywraca poczucie sprawczości ciała. Joga, tai chi, ruch w naturze.

03 Mój zestaw narzędzi awaryjnych

MOJA TECHNIKA PIERWSZEGO WYBORU

— 5–4–3–2–1 / oddech / temperatura / głos / ruch; co testowałem/-am i działa

TECHNIKA ZAPASOWA

— gdy pierwsza nie działa lub kontekst nie pozwala (np. w pracy, w komunikacji miejskiej)

GDZIE MAM FIZYCZNE PRZYPOMNIENIE

— karteczka w portfelu, ekran telefonu, naklejka na lustrze; w kryzysie nie pamiętasz technik

PLAN PRAKTYKI POZA KRYZYSEM

— 5–4–3–2–1 raz dziennie, bez powodu; trening, by w kryzysie technika była dostępna

Klucz: polisensoryczne *grounding* trzeba ćwiczyć poza kryzysem, by była dostępna w kryzysie. W aktywacji ciała migdałowatego pamięć i kora przedczołowa są ograniczone — jeśli technika nie jest wytrenowana, klient jej nie zastosuje. Codzienne 1–3 min ćwiczenia (np. rano przy kawie) tworzy ścieżkę neuronalną dostępną automatycznie. To *nie* przesada — to neurologia. Najszybsza droga z retrospekcji do teraźniejszości prowadzi *nie* przez myślenie, ale przez zmysły. Kora przedczołowa „włącza się” z powrotem, gdy obszary sensoryczne zostały nasycone aktualnymi, bezpiecznymi bodźcami.

△ U niektórych pacjentów dotyk lub kontakt wzrokowy może być wyzwalaczem — wtedy techniki bezdotykowe (głos, temperatura, ruch) są pierwszym wyborem. U dysocjacyjnych pacjentów silne bodźce somatyczne mogą destabilizować — zaczynamy od delikatnych. Indywidualny dobór jest kluczowy.