

Autowspółczucie — wprowadzenie

Najsilniejsza alternatywa dla samokrytyki. Nie pozytywne myślenie — głęboka zmiana relacji z sobą.

CZAS: 20 min nauki + codzienna praktyka 2 tygodnie

ŹRÓDŁO: Gilbert (2009, 2010); Neff (2003, 2011); Neff & Germer (2013)

JAK UŻYWAĆ

Przeczytaj **trzy komponenty autowspółczucia** (sekcja 01) wg Neff: życzliwość zamiast krytyki, wspólne człowieczeństwo, uważność. Naucz się **praktyki przerwy autowspółczucia** (sekcja 02) — 1-minutowa technika do stosowania w trudnym momencie. Praktykuj **codziennie przez 2 tyg.** (sekcja 03). Cel: zmiana *wewnętrznego tonu* z karzącego na wspierający.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Depresja często działa w **trybie zagrożenia** (Gilbert 2009 — terapia skoncentrowana na współczuciu, ang. *Compassion-Focused Therapy*, CFT): mózg traktuje siebie jak zagrożenie, atakuje samokrytyką, jakby chciał się ochronić. Skutek: chroniczny stres, kortyzol, wstyd. Autowspółczucie (ang. *self-compassion*, Neff 2003) **aktywuje przeciwny system** — system kojenia i więzi (oksytocyna, opiaty endogenne, parasympatyk). To *nie pozytywne myślenie*, nie „bądź dla siebie miły” jako afirmacja — to **fizjologiczna zmiana stanu**, w którym mózg działa. Metaanaliza (Wilson i wsp. 2019, 27 RCT): interwencje autowspółczucia redukują depresję (efekt 0.54), wstyd (0.69), samokrytykę (0.74). Działa szczególnie u pacjentów ze schematem bezwartościowości (#20).

01 Trzy komponenty autowspółczucia (Neff)

1 · ŻYCZLIWOŚĆ

zamiast samokrytyki

W trudnym momencie traktuj siebie *tak, jak traktowałbyś/-abyś bliskiego przyjaciela* w tym samym stanie.

NIE: „Znowu zawiodłeś/-aś.”

TAK: „To jest trudne. Wiem, że robisz, co możesz.”

2 · WSPÓLNE CZŁOWIECZEŃSTWO

zamiast izolacji

Pamiętaj, że *cierpienie i porażki są częścią ludzkiego doświadczenia*. Nie jesteś sam/-a z tym.

NIE: „Tylko ja mam tak źle.”

TAK: „Wielu ludzi przechodzi przez podobne trudności.”

3 · UWAGAŃNOŚĆ

zamiast pochłonięcia

Zauważaj cierpienie z *dystansem*, bez utożsamiania się z nim. Emocja jest, nie jesteś nią.

NIE: „Jestem cały/-a tym smutkiem.”

TAK: „Czuję smutek. To jeden ze stanów.”

02 ● Przerwa autowspółczucia (1 minuta · Neff)

Gdy zauważysz, że masz **trudny moment** (krytykujesz się, czujesz wstyd, jest ciężko), zatrzymaj się i powiedz *w myślach lub na głos*:

Krok 1 · Uważność: „*To jest moment cierpienia.*” (lub: „To jest trudne”, „Boli”)

Krok 2 · Wspólne człowieczeństwo: „*Cierpienie jest częścią życia. Inni też przez to przechodzą.*”

Krok 3 · Życzliwość: „*Niech będę dla siebie dobry/-a. Niech sobie dam, czego teraz potrzebuję.*”

Możesz dodać **gest fizyczny**: dłoń na sercu, splecione dłonie, dłonie na policzkach. Dotyk wzmacnia aktywację systemu kojenia (Neff & Germer 2013).

03 — Dziennik praktyki — 14 dni

Codziennie zastosuj **1 raz** przerwę autowspółczucia. Zapisz, w jakim momencie i co zauważyłeś/-aś.

DZ.	SYTUACJA TRUDNA <i>co się działo</i>	CO ZAUWAŻYŁEM/-AM PO PRAKTYCE	CZY ŁAGODNIEJ? 0– 10
Pn1			
Wt1			
Śr1			
Cz1			
Pt1			
Sb1			
Nd1			
Pn2			
Wt2			
Śr2			
Cz2			
Pt2			
Sb2			
Nd2			

Częsta trudność: „nie zasługuję na życzliwość”. To *głos samokrytyki* — i właśnie on jest celem pracy. Neff (2011): pacjenci ze schematem bezwartościowości potrzebują 2–3 tygodni, zanim autowspółczucie przestanie wydawać się „udawane” lub „rozpieszczające”. To *nie* jest pobłażanie sobie — jest to **fundament motywacji**. Badania: osoby ze współczuciem do siebie są *bardziej*, nie mniej, odpowiedzialne za swoje błędy, ale *bez* destrukcyjnej samokrytyki. Następne narzędzie: #22 *wewnętrzny krytyk* — dialog z głosem, który atakuje.