

Eksperyment z *unikaniem*

Co stanie się, jeśli zrobię to, czego unikam? Mózg w depresji przewiduje katastrofę — eksperyment sprawdza prawdę.

CZAS: 20 min planowania + tydzień ekspozycji 1 obszar unikania / tydzień

ŹRÓDŁO: Veale (2008); Hackmann i wsp. (2011); Beck (1979); Martell i wsp. (2001)

JAK UŻYWAĆ

Zidentyfikuj **3 obszary, których unikasz** (sekcja 01) — pracy, kontaktu, decyzji, ciała. Wybierz **jeden** z najmniejszych. Zaplanuj **ekspozycję stopniową** w 5 krokach (sekcja 02). Wykonaj w ciągu tygodnia, prowadź dziennik (sekcja 03). Cel: sprawdzić, czy przewidywanie katastrofy się sprawdza.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Unikanie jest **centralnym mechanizmem podtrzymującym** depresję (Martell i wsp. 2001). Pacjent unika sytuacji, które przewiduje jako trudne — to *krótkoterminowo* redukuje dyskomfort, ale *długoterminowo*: (1) zawęża świat, (2) blokuje doświadczenia korygujące, (3) wzmacnia przekonanie „nie poradzę sobie”. Veale (2008) i Hackmann i wsp. (2011): **eksperyment z unikaniem** (ang. *behavioral experiment with avoidance*) działa jak ekspozycja w terapii lęku — pacjent wystawia się na unikaną sytuację i sprawdza, czy katastrofa się spełnia. W ~85 % przypadków: *nie*. Mózg gromadzi nowe dane: „dało się”, „byłem zmęczony, ale dał/a/em radę”, „nikt nie zauważył mojej porażki”. Te dane stopniowo zmieniają mapę świata.

01 = Cztery typy unikania w depresji

1 · SPOŁECZNE

Nie odbieram telefonu, odwołuję spotkania, nie idę na imprezy, ignoruję maile.

2 · ZADANIOWE

Odkładam mail, decyzję, sprzątanie, rachunki, wizytę u lekarza, trudną rozmowę.

3 · EMOCJONALNE

Nie myślę o trudnym temacie, nie czuję smutku (rozpraszam się), nie pokazuję uczuć.

4 · CIELESNE

Leżę zamiast wstawać, nie ćwiczę, nie myję się, nie wychodzę z domu, nie jem regularnie.

3 OBSZARY, KTÓRYCH NAJCZĘŚCIEJ UNIKAM

— od najmniejszego do największego

02 ● Ekspozycja stopniowa — 5 kroków

CO UNIKAM

— jedno, konkretne

CO PRZEWIDUJĘ, ŻE SIĘ STANIE

DRABINA EKSPOZYCJI

— od najmniejszego kroku do pełnej sytuacji

1.

2.

3.

4.

5.

Przykład drabiny dla unikania pisania maila: 1. Otwieram skrzynkę i czytam mail. 2. Otwieram okno odpowiedzi. 3. Piszę 1 zdanie wstępne. 4. Kończę odpowiedź. 5. Wysyłam. **Każdy krok to mini-eksperyment** — sprawdzasz, czy katastrofa się dzieje na każdym etapie.

03 — Dziennik ekspozycji — 5 kroków

KROK	CO ZROBIŁEM/-AM	CO PRZEWIDYWAŁEM/-AM	CO RZECZYWIŚCIE SIĘ STAŁO	LĘK PRZED 0–10	LĘK PO 0–10
1					
2					
3					
4					
5					

Kluczowy mechanizm: mózg uczy się *po doświadczeniu*, nie po argumencie. Pierwsze kroki są najtrudniejsze — lęk jest wysoki (8–10/10). Po kilku ekspozycjach mózg *zaczyna rozumieć*: „aha, to nie jest tak straszne”. Lęk spada do 3–5/10. To moment *habitacji* — mózg uczy się, że unikanie nie jest potrzebne. *Nie skacz kroków* — jeśli krok 3 jest jeszcze za trudny, zrób krok 2.5. Veale (2008): pacjenci, którzy zachowują stopniową drabinę, mają 3× wyższą skuteczność niż ci, którzy „rzucają się na głęboką wodę”.