

Sygnały ostrzegawcze nawrotu

Depresja rzadko spada nagle. Ma 2–4 tygodnie objawów zwiastunowych. Rozpoznanie ich w pierwszym tygodniu = wcześniejsza interwencja = krótszy epizod.

CZAS: 30 min identyfikacji Kontrola raz na 2 tygodnie.

ŹRÓDŁO: Kupfer & Frank (1987); Fava i wsp. (2007); Bockting i wsp. (2015); Mocking i wsp. (2016)

JAK UŻYWAĆ

Zidentyfikuj **swoje 5 sygnałów zwiastunowych** (sekcja 02) — w 5 obszarach: sen, energia, myślenie, zachowanie, ciało. Wybierz je z **listy typowych sygnałów** (sekcja 01) + dodaj indywidualne. Co 2 tygodnie wykonaj **autoocenę** (sekcja 03). Cel: złapać początek nawrotu w 1. tygodniu, nie w 5.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Kupfer & Frank (1987) opisali **objawy prodromalne** (zwiastunowe) depresji: w 80 % przypadków pełny nawrót poprzedzony jest 2–4 tygodniami subtelnych zmian. Fava i wsp. (2007): pacjenci nauczeni rozpoznawania swoich sygnałów reagują średnio **3 tygodnie wcześniej** niż grupa bez treningu. Bockting i wsp. (2015) w prospektywnym badaniu 5 lat: **świadomość sygnałów + plan interwencji** (#33) obniżyły liczbę nawrotów o 41 %. Mechanizm: gdy depresja się rozwija, mózg **traci wgląd** — nie rozpoznaje, że to depresja, racjonalizuje („mam ciężki tydzień”, „dobrze, że odpoczywam”). Lista **przed** nawrotem działa jak **obiektywne narzędzie**, niezależne od aktualnego stanu poznawczego. Mocking i wsp. (2016): świadomość 3+ sygnałów przez 5+ dni = decyzja o booster session.

01 = Typowe sygnały zwiastunowe (5 obszarów)

🌙 SEN

Trudność z zasypianiem, pobudki o 3–4 rano, wczesne wybudzanie się, sen niespokojny, drzemki w dzień, „nie chce mi się wstawać”.

⚡ ENERGIA

Zmęczenie poranne, trudność w „rozkreśleniu się”, odkładanie zadań, anhedonia (mniej radości), spadek libido, „wszystko mi ciężko”.

🧠 MYŚLENIE

Powrót ruminacji (#12), nasilenie samokrytyki, „zawsze/nigdy”, katastrofizacja, myśli „to się nigdy nie skończy”, powrót przekonań kluczowych (#19).

👤 ZACHOWANIE

Wycofanie ze spotkań, odwoływanie planów, niewracanie wiadomości, zaniedbanie higieny, mniej ćwiczeń, więcej alkoholu/jedzenia.

👉 CIAŁO

Bóle głowy, ucisk w klatce, ściśnięty żołądek, napięcie w karku, zmiana apetytu (więcej / mniej), spadek masy, problemy z koncentracją.

02 \ Moje 5 indywidualnych sygnałów

1. SEN

— mój konkretny sygnał

2. ENERGIA

3. MYŚLENIE

4. ZACHOWANIE

5. CIAŁO

03 — Autoocena co 2 tygodnie — 12 tygodni

Co 2 tygodnie zaznacz, ile sygnałów się aktywowało. **3+ sygnałów przez 2 tyg. = sygnał alarmowy** (poziom 2, plan #33).

TYDZ.	🧐 SEN	⚡ ENERGIA	🧠 MYŚLENIE	👥 ZACHOW.	💪 CIAŁO	SUMA ×	AKCJA?
Tyg. 1–2							
Tyg. 3–4							
Tyg. 5–6							
Tyg. 7–8							
Tyg. 9–10							
Tyg. 11–12							

Interpretacja sumy: 0–1 sygnałów = norma, kontynuuj. 2 sygnały = obserwuj, wzmocnij podstawy (poziom 1 z planu #33). **3+ sygnałów przez 2 tyg. = poziom 2** — zadzwoń do terapeuty, booster session. **5 sygnałów + myśli o śmierci = poziom 3** — natychmiast plan SOS (#35), psychiatra. Fava (2007): pacjenci, którzy wykonują autoocenę co 2 tyg., reagują na nawrót średnio 18 dni wcześniej niż ci bez systematycznej kontroli — różnica decydująca między „lekki spadek” a „pełny epizod”.