

Kontakt *społeczny*

Isolacja jest jednym z najsilniejszych biologicznych czynników depresji. Mózg człowieka źle znosi samotność — ewolucyjnie.

CZAS: 15 min planowania + 4 tyg. wdrażania 4 tygodnie

ŹRÓDŁO: Cacioppo & Hawkley (2009); Holt-Lunstad i wsp. (2015); Cuijpers i wsp. (2011, IPT); Lim i wsp. (2020)

JAK UŻYWAĆ

Przeczytaj **3 typy kontaktu społecznego** (sekcja 01) — różne potrzeby. Zidentyfikuj **swoje 5 osób** w trzech kręgach (sekcja 02). Zaplanuj **1 mikrokontakt dziennie + 1 spotkanie tygodniowo** przez 4 tyg. (sekcja 03). Cel: *nie* być duszą towarzystwa, ale przerwać izolację, która podtrzymuje depresję.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Cacioppo & Hawkley (2009): **samotność** (ang. *loneliness*) ma porównywalny wpływ na zdrowie jak palenie 15 papierosów dziennie. Mózg społeczny traktuje izolację jako **zagrożenie** — aktywuje kortyzol, stan zapalny. Holt-Lunstad i wsp. (2015, metaanaliza n=3,4 mln): samotność **podwaja** ryzyko śmiertelności (1.9×). W depresji izolacja działa jako **czynnik podtrzymujący**: wycofanie → mniej dowodów przeczących rdzeniowi „nikt mnie nie kocha” → głębsza depresja. Cuijpers (2011): **IPT** (terapia interpersonalna) ma efekt równy CBT. Lim i wsp. (2020): nawet **jeden silny kontakt** tygodniowo redukuje ryzyko depresji o 33 %.

01 Trzy typy kontaktu społecznego

MIKROKONTAKTY

2–5 min, *dziennie*

„Dzień dobry” do sąsiada, uśmiech do kasjerki, krótka rozmowa o pogodzie. *Niezobowiązujące*, ale aktywują system społeczny mózgu.

Cel: **1 dziennie**, choćby przelotny.

BLISKIE SPOTKANIA

30–120 min, *tygodniowo*

Kawa z przyjaciółmi, kolacja z rodziną, spacer z partnerem/-ką. *Twarzą w twarz* (lub przez wideo, jeśli nie ma innej opcji).

Cel: **1 tygodniowo minimum**.

WSPÓLNA AKTYWNOŚĆ

grupa, regularna

Klub książki, kurs, sport zespołowy, wolontariat. *Wspólny cel* buduje więź bez konieczności prowadzenia rozmów.

Cel: **1 regularna aktywność** w ciągu miesiąca.

Wszystkie trzy typy są *różne i uzupełniające*. Mikrokontakty dają poczucie „nie jestem niewidzialny/-a”. Bliskie spotkania — głębokie wsparcie. Wspólna aktywność — przynależność do grupy.

02 Moje 5 osób — mapa kontaktów

KRĄG 1 · NAJBLIŻSI

— 1–2 osoby

KRĄG 2 · BLISCY

— 2–3 osoby

KRĄG 3 · ZNAJOMI

— 1–2 osoby

Mniej niż 5? To częste w depresji — sieć kontaktów zwiększyła się przez wycofanie. Lista i tak jest cenna: pokazuje, kto *jest*, choć rzadko widzisz. Nie potrzebujesz nowych ludzi — potrzebujesz *odnowienia kontaktu* z istniejącymi.

03 — Plan kontaktów — 4 tygodnie

Co tydzień zaplanuj: 1 spotkanie + 5 mikrokontaktów + ew. wspólna aktywność.

TYDZ.	SPOTKANIE BLISKIE <i>kto + kiedy + gdzie</i>	MIKROKONTAKTY (5 DZIENNIE?) <i>notatki</i>	WSPÓLNA AKTYWNOŚĆ?	NASTRÓJ TYGODNIA <i>0–10</i>
Tyg. 1				
Tyg. 2				
Tyg. 3				
Tyg. 4				

Częsta trudność: „nie chce mi się dzwonić”, „nie chcę nikogo obciążać”. To *głos depresji*, nie fakt. Mózg w depresji *przewiduje* negatywne reakcje innych i unika kontaktu, by się chronić. Eksperyment: napisz **1 wiadomość** do bliskiej osoby (krótka, „myślałem/-am o tobie”). Sprawdź, co realnie się stanie. W 90 % przypadków: ciepła odpowiedź, propozycja spotkania. Cacioppo (2009): przerwanie spirali izolacja → depresja → izolacja wymaga *działania mimo niechęci* — niechęć ustępuje *po* kontakcie, nie przed.