

Trening odwracania *nawyku*

HRT (Azrin & Nunn 1973) — **najlepiej przebadana interwencja w BFRB**. Meta-analiza: $g = 1,19$ (duży efekt). Trzy składniki: **świadomość + reakcja konkurencyjna + wsparcie**.

CZAS: 8–12 sesji · trening codzienny Leczenie pierwszego rzutu

ŹRÓDŁO: Azrin & Nunn (1973); Bate i in. (2011, meta-analiza); Selles i in. (2016)

JAK UŻYWAĆ

Poznaj **trzy składniki HRT** (sekcja 1), zobacz **jak działa reakcja konkurencyjna** w praktyce (sekcja 2). W sekcji 3 wybierz **swoją reakcję konkurencyjną** i zaplanuj wsparcie społeczne.

DLACZEGO TO DZIAŁA

HRT (*Habit Reversal Training*, Azrin & Nunn, 1973) to **najlepiej przebadana** interwencja w BFRB. Bate i in. (2011, meta-analiza 11 RCT): wielkość efektu $g = 0,77$ dla wszystkich BFRB. Selles i in. (2016, nowsza meta-analiza dla dermatillomanii): terapie behawioralne (HRT i CBT) $g = 1,19$ — bardzo duży efekt, porównywalny z najlepszymi interwencjami w psychiatrii. Mechanizm: trening uwagi → rozpoznanie sygnału ostrzegawczego → zastąpienie czynności reakcją niezgodną → wygaszenie odruchu. **Kluczowy warunek skuteczności:** trening świadomości *jako pierwszy* składnik. Bez świadomości reakcja konkurencyjna jest stosowana *za późno* — gdy dłubanie już się rozpoczęło. Dlatego HRT wymaga 2–3 tygodni przygotowania, zanim wprowadzi się reakcję konkurencyjną. To *nie* jest „zamiana nawyku” — to systematyczna praca z automatyzmem.

01 📋 Trzy składniki HRT

1 · TRENING ŚWIADOMOŚCI

Rozpoznawanie *sygnałów ostrzegawczych*: myśl, czucie, ruch ręki, miejsce, kontekst. Bez świadomości nie ma interwencji. Pierwsze 2–3 tygodnie.

2 · REAKCJA KONKURENCYJNA

Ruch *niezgodny* z dłubaniem: zaciśnięte pięści, schowane ręce, ściśnięta piłka. Wykonujesz przez 1–2 min lub do ustąpienia impulsu.

3 · WSPARCIE SPOŁECZNE

Jedna bliska osoba zauważa i delikatnie zwraca uwagę: „widzę, że ręka idzie do twarzy”. Pomaga w fazach, gdy świadomość jest słaba.

02 🧠 Reakcja konkurencyjna — co działa

Kryteria dobrej reakcji konkurencyjnej: (1) *niezgodna* z dłubaniem (nie można robić jednocześnie), (2) *niewidoczna* społecznie (można wykonywać przy ludziach), (3) *łatwa* do utrzymania przez 1–2 minuty.

ZACIŚNIJ PIĘŚCI

Najczęstsza i najprostsza. Mocno zaciśnij pięści przez 30–60 sekund. Niewidoczne społecznie, działa wszędzie.

SCHOWAJ RĘCE POD UDA

Siedzący — schowaj dłonie pod uda lub kolana. Bariera fizyczna + zajęcie rąk. Działa w pracy, autobusie, na kanapie.

ŚCIŚNIJ PIŁKĘ ANTYSTRESOWĄ

W kieszeni, na biurku, w torebce. Daje sensoryczny zamiennik dla potrzeby ściskania/wyciskania.

SKRZYŻUJ RAMIONA

Ramiona skrzyżowane na klatce piersiowej. Dłonie w „uwięzi” — niedostępne dla skóry. Lekko widoczne, ale akceptowalne.

03 Mój plan HRT

MÓJ NAJCZĘSTSZY WZORZEC DŁUBANIA

— która ręka, które palce, jaki ruch, gdzie na ciele

MOJE WCZESNE SYGNAŁY

— co się dzieje 30 sek. przed dłubaniem

MOJA REAKCJA KONKURENCYJNA

— wybierz z sekcji 2 lub własną; pamiętaj o 3 kryteriach

MOJA OSOBA WSPARCIA

— imię, jak mam jej powiedzieć, jakiego rodzaju przypomnień potrzebuję

04 Stopniowe wdrożenie HRT — 4 fazy

TYG. 1–2

Tylko świadomość.
Dziennik 5-kolumnowy.
Bez prób zatrzymania
— najpierw *obserwacja*.

TYG. 3–4

Reakcja konkurencyjna
gdy *zauważysz* impuls.
Nie zawsze się uda —
to OK, ważna sama
próba.

TYG. 5–8

Konsolidacja. Reakcja
konkurencyjna staje się
automatyczna.
Dziennik wskazuje
wzorce.

TYG. 9–12

Generalizacja na nowe
sytuacje. Profilaktyka
nawrotów. Stopniowe
odsuwanie dziennika.

Klucz: HRT to **nie jest „zamiana nawyku”** — to systematyczne odprogramowywanie automatycznego łańcucha behawioralnego. Najczęstszy błąd: pacjent stosuje reakcję konkurencyjną *bez awareness* — reaguje za późno, gdy dłubanie już się rozpoczęło, frustruje się i porzuca technikę. Dlatego Azrin & Nunn (1973) byli kategoryczni: *awareness pierwszy, dopiero potem competing response*. Drugi błąd: oczekiwanie natychmiastowego sukcesu. HRT wymaga **8-12 tygodni** systematycznej pracy. Pierwsze 3-4 tygodnie często wyglądają jak *żaden postęp* — bo dopiero zauważasz, jak dużo dłubiesz. To *jest* postęp — świadomość rośnie. Statystycznie istotna redukcja widoczna od 6. tygodnia (Selles, 2016). Cierpliwość + systematyczność = duży efekt długoterminowy.