

Zaspokój potrzebę *bez uszkodzeń*

Wiele osób dłubie dla stymulacji sensorycznej — potrzeby dotykania, ściskania, oddzierania. Zamienniki muszą być podobne sensorycznie, nie tylko „odwracać uwagę”. Audyt + 5–7 testów.

CZAS: 15 min · audyt + zakupy Gdy ręce „muszą coś robić”

ŹRÓDŁO: Mansueto i in. (ComB Sensory); Falkenstein & Haaga (2014); TLC Foundation tool-kit

JAK UŻYWAĆ

Zidentyfikuj **jaki komponent sensoryczny** Cię ciągnie do dłubania (sekcja 1), poznaj **zamienniki dopasowane do każdego komponentu** (sekcja 2). W sekcji 3 zaplanuj **test 5-7 alternatyw** i wybierz top 2.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Mansueto w modelu ComB wskazał *Sensory factor* jako jedną z pięciu domen wyzwalaczy. U części pacjentów to **dominujący** mechanizm — dłubanie służy zaspokojeniu konkretnej potrzeby sensorycznej (dotyk, ścisk, oddzieranie, szukanie nierówności). Najczęstszy błąd: pacjent kupuje *jeden* fidget toy, mówi „*nie pomaga*” i porzuca strategię. Falkenstein & Haaga (2014): kluczem jest **audyt sensoryczny** — jaki *konkretny* komponent dotykowy szukasz? Następnie test 5-7 *alternatyw* przez tydzień. TLC Foundation prowadzi listę narzędzi pogrupowanych według funkcji. **Zasada:** alternatywa musi być *sensorycznie podobna* do dłubania — nie wystarczy „odwracać uwagę”.

01 🕒 Audyt — co konkretnie szukam?

Zaznacz, które komponenty sensoryczne są *silne* w Twoim dłubaniu. Większość osób ma 2–3 dominujące komponenty. To wskaże, jakie alternatywy warto testować.

ŚCISKANIE / WYCISKANIE

Potrzeba siły ścisku. Wyciskanie krost, wrywanie strupów. Sensoryczny komponent „*siły palców*”.

DRAPANIE / SKUBANIE

Potrzeba mikroruchów paznokciami. Drapanie powierzchni, skubanie naskórka. Komponent rytmiczny.

SZUKANIE NIERÓWNOŚCI

Skanowanie skóry palcami w poszukiwaniu „*czegoś nie tak*”. Potrzeba znalezienia faktury, ostrego elementu.

ODDZIERANIE / WYRYWANIE

Strupy, naskórki, paznokcie. Potrzeba „*uwolnienia*” — ruchu oddzielającego. Często z satysfakcją po.

02 📋 Zamienniki — dopasowane do komponentu

DLA ŚCISKANIA

Piłka antystresowa, folia bąbelkowa (pękanie bąbelków), plastelina, slime, magnetyczne kulki, miękki *squishy toy*.

DLA DRAPANIA / SKUBANIA

Velcro (rzep) naklejone na brelok, kamień *worry stone*, materiał z fakturą (filc, juta), sztuczna skóra do drapania.

DLA SZUKANIA

Bransoletka z koralikami (przesuwanie), różaniec *mala*, pęk kluczy (manipulacja), *fidget spinner*, *tangle toy*.

DLA ODDZIERANIA

Plastry naklejone na kartkę (zrywanie), naklejki, taśma malarska, gumka recepturka (rozciąganie), pasta *therapy putty*.

03 Test 5–7 alternatyw w tygodniu

Wybierz 5–7 zamienników z sekcji 2 (lub własnych). Przez tydzień testuj różne sytuacje. Oceń każdy w 3 wymiarach: *siła ulgi*, *łatwość użycia*, *akceptowalność społeczna*.

ALTERNATYWA	ULGA (0–10)	ŁATWOŚĆ (0–10)	SPOŁ. (0–10)

04 Mój zestaw — top 2 + miejsca

TOP 2 ALTERNATYWY

— *te, które wybieram po teście*

GDZIE JE TRZYMAM

— *przy łóżku, w torebce, na biurku, w łazience*

Klucz: zamiennik sensoryczny *nie* jest „dystrakcją” — to **zaspokojenie konkretnej potrzeby** alternatywnym sposobem. Falkenstein & Haaga (2014): pacjenci, którzy *dopasowali* zamienniki do swojej dominującej potrzeby sensorycznej, mieli 2× lepsze wyniki niż ci, którzy wybierali „*cokolwiek do trzymania w rękach*”. **Praktyczna wskazówka:** miej *dwa różne* zestawy — jeden w łazience (gdzie najczęściej dłubiesz przed lustrem), drugi w torebce/kieszeni (dla sytuacji nieprzewidzianych). TLC Foundation oferuje *fidget kits* dopasowane do typów BFRB — warto sprawdzić ich rekomendacje. Pamiętaj: *jedna alternatywa nie wystarczy* dla wszystkich sytuacji. Buduj swoją mini-bibliotekę — różne narzędzia na różne potrzeby. Po 4–6 tygodniach mózg uczy się sięgać po nie automatycznie.