

Rozwiązywalne *vs* hipotetyczne

80 % obaw w GAD jest hipotetyczna — nie da się ich „rozwiązać” myśleniem. Eksperyment to pokazuje.

CZAS: tydzień obserwacji + eksperyment 1 tydz. zbierania danych

ŹRÓDŁO: Dugas i wsp. (2007); D'Zurilla & Nezu (2007); Robichaud i wsp. (2019)

JAK UŻYWAĆ

Przez tydzień **spisuj wszystkie martwienia** (sekcja 02). Każde sortuj na **rozwiązywalne** vs **hipotetyczne** (sekcja 01 — kryteria). Policz proporcję. Dla rozwiązywalnych — **działaj** (problem-solving). Dla hipotetycznych — **odpuść** (akceptacja, defuzja, czas na martwienie). Po tygodniu zobacz, ile spraw rzeczywiście wymagało działania.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Pacjenci z GAD traktują wszystkie obawy **jednakowo** — analizują je w nieskończoność, jakby każda była problemem do rozwiązania. Tymczasem badania Dugasa pokazują: w GAD **~80 % martwień** jest **hipotetycznych** („a co jeśli za rok...?”, „co jeśli kiedyś...?”) — nie da się ich rozwiązać, bo nie istnieje konkretny problem do działania. Ten eksperyment dostarcza **danych empirycznych**: pacjent *widzi czarno na białym*, że większość jego pracy umysłowej dotyczy spraw, których nie da się rozwiązać. To zmiana podejścia: *klasyfikuj zanim analizujesz*.

01



Kryteria sortowania

ROZWIĄZYWALNE

Test: czy istnieje konkretne działanie, które dziś / w tym tygodniu mogę wykonać?

Cechy:

- ✓ konkretna sytuacja istnieje teraz
- ✓ leży w obszarze mojej kontroli
- ✓ jest mierzalna (zrobione / nie zrobione)
- ✓ ma określony termin

Przykłady: „Rachunek do zapłaty jutro”, „Konflikt z koleżanką do wyjaśnienia”, „Spadek wagi → wizyta u lekarza”, „Zaległe maile”.

Działanie: **problem-solving** (narzędzie #3).

HIPOTETYCZNE

Test: czy mogę cokolwiek zrobić *dziś*, by zmienić sytuację?

Cechy:

- ✗ dotyczy przyszłości / „a co jeśli”
- ✗ leży poza moją kontrolą
- ✗ nie ma konkretnego działania
- ✗ pytanie bez terminu

Przykłady: „A co jeśli za 5 lat zachoruję?”, „Co jeśli mąż mnie zostawi?”, „Co jeśli stracę pracę kiedyś?”, „A co jeśli wybuchnie wojna?”.

Działanie: **akceptacja** (#11), **defuzja** (#9), **czas na martwienie** (#2).

02 Dziennik martwien — tydzień

DZ.	MARTWIENIE <i>krótko, jednym zdaniem</i>	TYP <i>R / H</i>	CO ZROBIŁEM/-AM
<i>Pn</i>			
<i>Wt</i>			
<i>Śr</i>			
<i>Cz</i>			
<i>Pt</i>			
<i>Sb</i>			
<i>Nd</i>			

03 Analiza po tygodniu

ILE MARTWIEN RAZEM? 	ROZWIĄZYWALNE (R) — ILE? % 	HIPOTETYCZNE (H) — ILE? %
------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------

04 Wnioski

JAKA PROPORCJA OKAZAŁA SIĘ HIPOTETYCZNA?
 — zgodne z danymi z badań (~80 %)?

CO TO ZMIENIA W MOIM PODEJŚCIU DO
 MARTWIENIA?

MÓJ NOWY „ODRUCH” PRZY POJAWIENIU SIĘ MARTWIENIA

— pytanie do siebie

Typowy wynik: 70–85 % martwien jest hipotetyczna. To znaczy, że *ogromna większość* energii umysłowej idzie na sprawy, których nie można rozwiązać myśleniem. Po tym eksperymencie pacjent zaczyna automatycznie zadawać sobie *jedno pytanie* przed analizą: „**Czy mogę coś z tym zrobić dziś?**”. Jeśli tak — działa (problem-solving). Jeśli nie — odpuszcza (akceptacja, defuzja, czas na martwienie). Klasyfikacja **przed** analizą oszczędza godziny tygodniowo.