

Ekspozycja *pisemna na obawy*

Zamiast uciekać od najgorszego scenariusza — wejdź w niego pisemnie. 20–30 min dziennie, aż lęk sam opadnie.

CZAS: 30 min sesja Codziennie przez 1–2 tyg.

ŹRÓDŁO: Borkovec & Costello (1993); Goldman i wsp. (2007)

JAK UŻYWAĆ

Wybierz **jedną dręczącą obawę**. Spisz najgorszy realistyczny scenariusz w czasie *teraźniejszym*, w *pierwszej osobie* (jakby się działo teraz), uwzględniając wszystkie zmysły: co widzisz, czujesz, słyszysz, myślisz. Czytaj tekst **na głos lub w głowie przez 20–30 min**, codziennie, dopóki lęk nie spadnie naturalnie o $\geq 50\%$.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Martwienie w GAD ma paradoksalny charakter — pacjent *obraca obawę w głowie*, ale nigdy nie kończy scenariusza i nie pozwala emocji w pełni się rozwinąć. To **częściowa ekspozycja**, która nie pozwala na habituację (przywyczajenie). Ekspozycja pisemna wymusza *pełne* wejście w scenariusz, co aktywuje sieć lękową i pozwala mózgowi **nauczyć się**, że wyobrażenie nie jest tożsame z zagrożeniem. Skuteczność potwierdzona w badaniach RCT (ang. randomized controlled trials — kontrolowane próby z randomizacją) dla GAD.

PRZED Zaznacz przed pierwszą sesją.

Lęk teraz *spokój* 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

max lęk

01 Wybór obawy — przygotowanie

Wybierz **jedną obawę**, do której wracasz najczęściej. Nie zaczynaj od najsilniejszej (10/10) — wybierz średnio silną (6–8/10), żeby pozwolić sobie nauczyć się techniki.

MOJA OBAWA

— jedno zdanie, konkretnie

AKTUALNA SIŁA OBAWY (0–10)

np. 7

NAJGORSZY SCENARIUSZ

— jedno zdanie

02 Reguły pisania scenariusza

CZAS TERAŹNIEJSZY, 1. OSOBA

NIE „kiedyś zachoruję”. TAK „**Leżę w szpitalu, słyszę pisk monitora, lekarz mówi...**”. Mózg reaguje na *obraz*, nie na hipotezę.

WSZYSTKIE ZMYŚLY

Co **widzisz**? Co **słyszysz** (głosy, dźwięki)? Co **czujesz** w ciele? Jakie myśli przelatują? Jakie emocje?

DO KOŃCA SCENARIUSZA

Nie zatrzymuj się w pół drogi. Idź dalej. Co się dzieje godzinę później? Dzień? Rok? Co czujesz w punkcie kulminacyjnym?

BEZ ZAPEWNIENI

NIE „ale jakoś sobie poradzę, znajdę sposób”. TAK pełna głębia bólu. To *nie* happy end. Pisanie ma **boleć**.

03 Procedura jednej sesji — 30 min

1 SPISZ SCENARIUSZ

10 min · raz

Pierwsza sesja: spisz tekst (~1 strona A4). Kolejne sesje: używaj tego samego tekstu lub rozszerz.

2 CZYTAJ WIELOKROTNIE

20 min · w pętli

Czytaj **na głos** lub w głowie, w skupieniu, *czując* emocje. Gdy skończysz — zaczynaj od początku.

3 SKALA PRZED / W TRAKCIE / PO

cała sesja

Oceń lęk co 5 min (0–10). Cel: szczyt w pierwszych 10 min → spadek o $\geq 50\%$ do końca sesji.

04 Dziennik sesji

DZ.	LĘK START 0–10	LĘK SZCZYT 0–10	LĘK KONIEC 0–10	CZAS min	CO ZAUWAŻYŁEM/-AM
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					

Pułapka tłumienia: w trakcie czytania mózg będzie chciał uciec („to bez sensu”, „już wystarczy”). To *znak*, że ekspozycja działa. **Wytrwaj** do końca sesji. Po 5–10 dniach scenariusz przestanie wywoływać silny lęk — to *habituacja*. To moment, w którym wybierasz nową obawę.

PO Po tygodniu sesji — średni poziom lęku przy myśli o tej obawie.

Lęk **PO**
tyg.

spokój (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

max lęk