

Aktywność fizyczna

30 min ruchu × 5 razy w tygodniu obniża lęk porównywalnie do SSRI. Bez recepty, bez działań niepożądanych.

CZAS: 30 min × 5 dni / tydz. Minimum 4 tyg. by zobaczyć efekt

ŹRÓDŁO: Stubbs i wsp. (2017); WHO (2020); Aylett i wsp. (2018)

JAK UŻYWAĆ

Wybierz **2-3 formy ruchu**, które realnie wykonasz (sekcja 01). Zaplanuj **cel FITT** — częstotliwość (F), intensywność (I), czas (T), typ (T) (sekcja 02). Prowadź dziennik 4 tygodni. Cel minimalny: *150 minut umiarkowanego wysiłku* tygodniowo (zalecenia WHO).

DLACZEGO TO DZIAŁA

Aktywność fizyczna obniża **poziom kortyzolu**, podnosi *BDNF* (czynnik wzrostu nerwów), wspiera neurogenezę w hipokampie, normalizuje rytm okołodobowy i obniża pobudzenie układu współczulnego. Metaanalizy pokazują efekt antylękowy **porównywalny do SSRI** w łagodnym i umiarkowanym GAD, przy braku działań niepożądanych. **Najważniejsza** zmiana lifestyle dla GAD — tańsza niż terapia, dostępna codziennie.

PRZED

Zaznacz „energia / sen / lęk” — ogólne samopoczucie w tygodniu wyjściowym.

Energia

zero

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

pełna

01



Wybór form ruchu

Najlepsza forma to ta, którą *realnie wykonasz*. Zaznacz 2-3, dopisz własne.

- | | | |
|--|--|---|
| ☐ Spacery — łatwy próg startu | ☐ Bieganie / trucht | ☐ Rower stacjonarny / zewnętrzny |
| ☐ Pływanie | ☐ Joga / pilates | ☐ Trening siłowy / kalistenika |
| ☐ Taniec / zumba | ☐ Sztuki walki | ☐ Wspinaczka / bouldering |
| ☐ Sport drużynowy | ☐ Ogrodnictwo aktywne | ☐ Inne — wpisz poniżej |

INNE FORMY AKTYWNOŚCI, KTÓRE MNIE CIESZĄ

02



Mój plan FITT

F CZĘSTOTLIWOŚĆ

ile razy w tygodniu? Cel: 4-5 razy.

I INTENSYWNOŚĆ

„mogę rozmawiać, ale nie śpiewać”

T CZAS (TIME)

ile minut? 30 min × 5 lub 45 × 3.

T TYP

co konkretnie wybieram?

03 × Bariery i strategie

„NIE MAM CZASU”

Wpisz w kalendarz na konkretną godzinę, jak spotkanie. Mniejsze porcje (3 × 10 min) liczą się tak samo jak 30 min razem. Schody zamiast windy.

„NIE MAM ENERGII”

Energia *powstaje* z ruchu, nie poprzedza go. Pierwszy tydzień zacznij od 5 min. Po 2 tyg. zauważysz wzrost energii w innych dniach.

„NUDZĘ SIĘ”

Podcast, audiobook, muzyka. Aktywność z drugą osobą — większa szansa wytrwania. Zmieniaj formy co 2 tyg., żeby uniknąć rutyny.

„NIE UMIEM, CZUJĘ SIĘ GŁUPIO”

Zacznij od formy zupełnie indywidualnej (spacer, rower). Aplikacja prowadząca (Couch to 5K, Nike Training). Brak osądu = pierwsze 4 tyg. sukcesu.

04 📅 Dziennik aktywności — 4 tygodnie

TYDZ.	DZ.	AKTYWNOŚĆ	CZAS min	LĘK PRZED 0–10	LĘK PO 0–10	CO ZAUWAŻYŁEM/-AM
1	Pn					
1	Śr					
1	Pt					
2	Pn					
2	Pt					
3	Śr					
4	Pn					

PO Po 4 tygodniach — uśredniona energia z ostatniego tygodnia.

Energia
PO 4 tyg.

zero 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

pełna

Po 4 tyg. typowo: sen się stabilizuje, lęk spada o 30–40 %, energia rośnie. Pierwszy tydzień jest zawsze najtrudniejszy — mózg domaga się powrotu do komfortu. To **okno habituacji**: jeśli przetrwasz 14 dni, mózg zacznie *pragnąć* ruchu. Najczęstszy błąd: za dużo na początku → bóle → rezygnacja. Lepiej: za mało przez 2 tyg., potem zwiększać.