

# Test *pozytywnych metaprzekonań*

„Muszę się martwić, żeby...” — sprawdź, czy to prawda. Dzień bez martwienia jako eksperyment empiryczny.

**CZAS:** tydzień eksperymentu 2 dni bez martwienia + porównanie

**ŹRÓDŁO:** Wells (2009); Wells & Carter (2001); Knowles & Wells (2018)

## JAK UŻYWAĆ

Zidentyfikuj **jedno** **pozytywne metaprzekonanie** o martwieniu (sekcja 01): „muszę się martwić, żeby X”. Zaplanuj **eksperyment porównawczy** (sekcja 02): wybierz 2 dni „normalne” (martwisz się) i 2 dni „bez martwienia” (odraczasz, używasz defuzji). Zapisz wyniki w sekcji 03. Sprawdź *empirycznie*: czy martwienie naprawdę pomaga w tym, w czym myślisz?

## DLACZEGO TO DZIAŁA

Pozytywne metaprzekonania są **centralne** dla utrzymania GAD wg modelu Wellsa (MCT). Pacjent nie pozbywa się martwienia, bo *wierzy, że mu służy*. Tę wiarę utrzymuje on od lat — i nigdy nie zweryfikował. Eksperyment behawioralny dostarcza **danych empirycznych**: w dniach „bez martwienia” jakość wykonania zadań jest *taka sama* lub *lepsza*, kreatywność rośnie, sen się poprawia. To moment, w którym całe przekonanie pęka — i pacjent uwalnia się od „obowiązku” martwienia.

## 01 Krok 1 · Identyfikacja przekonania

Wybierz **jedno** przekonanie do przetestowania (typowe formy poniżej).

- ☐ „Martwienie **pomaga mi** być przygotowanym”
- ☐ „Martwienie **chroni** mnie przed niespodziankami”
- ☐ „Martwienie **zapobiega** złym wydarzeniom”
- ☐ „Martwienie **motywuje mnie** do działania”
- ☐ „Martwienie **pokazuje** że mi zależy”
- ☐ „Martwienie **pomaga** w pracy / decyzjach”

**MOJE PRZEKONANIE DO PRZETESTOWANIA**

— sformułuj precyzyjnie

**WIARA W NIE TERAZ (0–100 %)**

np. 75 %

## 02 Krok 2 · Plan eksperymentu

### DNI „NORMALNE” (2 DNI)

Martw się **normalnie**, tak jak zwykle. Nie ograniczaj. Zapisuj: ile czasu martwisz, co zrobisz/-aś, jak się czujesz/-aś, jakość wykonania zadań.

**DATY:** \_\_\_\_\_ + \_\_\_\_\_

### DNI „BEZ MARTWIENIA” (2 DNI)

Gdy pojawia się myśl „a co jeśli...?”, użyj **defuzji** (#9) lub **odroczenia** (#31). Nie analizuj. Wracaj do zadania. Zapisuj *te same* wskaźniki.

**DATY:** \_\_\_\_\_ + \_\_\_\_\_

**Wskazówka:** wybierz dni *porównywalne* (np. dwa wtorki, dwa weekendy). Idealnie: dzień martwienia → dzień bez → dzień martwienia → dzień bez. Łatwiej zobaczysz różnicę.

### 03 Krok 3 · Wyniki — porównanie

| WSKAŹNIK                         | DZIEŃ MARTWIENIA<br>1 | DZIEŃ MARTWIENIA<br>2 | DZIEŃ BEZ 1 | DZIEŃ BEZ 2 |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| Czas martwienia<br>(h)           |                       |                       |             |             |
| Jakość wykonania<br>zadań (0-10) |                       |                       |             |             |
| Lęk średnio (0-10)               |                       |                       |             |             |
| Sen jakość (0-10)                |                       |                       |             |             |
| Coś złego się<br>stało? (T/N)    |                       |                       |             |             |
| Energia<br>wieczorem (0-10)      |                       |                       |             |             |

### 04 Krok 4 · Wniosek

CZY MARTWIENIE NAPRAWDĘ POMAGAŁO?

— porównaj wskaźniki obu rodzajów dni

CO ODKRYŁEM/-AM O PRZEKONANIU?

NOWE PRZEKONANIE

— bardziej realistyczne, oparte na danych

NOWA WIARA W STARE PRZEKONANIE (0–100 %)

**Typowy wynik:** w dniach „bez martwienia” — jakość wykonania *nie spada*, lęk jest *niższy*, sen *lepsz*y, energia *wyższa*. Żadnej katastrofy. To dane, które **burzą** pozytywne metaprzekonanie. Po eksperymencie wiara zwykle spada z 75 % do 20–30 %. Pacjent zaczyna myśleć: „a może to martwienie wcale mi nie służyło — tylko mi się tak wydawało?”. To otwiera drogę do pełniejszego stosowania *odroczenia, defuzji, czasu na martwienie*.