

Progresywna *relaksacja mięśni*

16 grup mięśniowych — napnij, rozluźnij, poczuj różnicę. Codziennie przez 4–6 tygodni.

CZAS: 15–20 min **Codziennie** **ŹRÓDŁO:** Jacobson (1938); Bernstein & Borkovec (1973)

JAK UŻYWAĆ

Usiądź lub połóż się wygodnie. Przejdź **16 grup mięśniowych** (od stóp do głowy). Każdą: **napnij 5–7 s** → **rozluźnij nagle 15–20 s** → **poczuj różnicę 5 s**. Codziennie 15–20 min przez 4–6 tyg.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Pacjent z GAD **nie zauważa** chronicznego napięcia (szczeka, barki, brzuch). Kontrast napięcie ↔ rozluźnienie buduje **interoceptywną świadomość** — uczy zauważać napięcie wcześniej. Conrad & Roth (2007): $d = 0,57$ dla redukcji lęku.

01 Zasada — 3 takty na każdą grupę

5–7 s
NAPNIJ

Mocno, bez bólu. Poczuj napięcie.

15–20 s
ROZLUŹNIJ

Nagle — „odpuść”. Zauważ ciepło, ciężar.

5 s

POCZUJ RÓŻNICĘ

Mózg uczy się *rozróżniać* napięcie od rozluźnienia.

02 Sekwencja — od stóp do głowy

Usiądź lub połóż się wygodnie. Zamknij oczy. Przejdź grupy **w kolejności** (każda 3 takty: napięcie → rozluźnienie → różnica). Cała sesja: 15–20 min.

#	GRUPA	JAK NAPIĄĆ	✓ ZROBIONE
1	Stopa prawa	Podkurcz palce, napnij łuk	☐
2	Stopa lewa	To samo, druga strona	☐
3	Łydka prawa	Pociągnij palce do siebie	☐
4	Łydka lewa	To samo, druga strona	☐
5	Udo prawe	Wyprostuj nogę, napnij mięsień czworogłowy	☐
6	Udo lewe	To samo, druga strona	☐
7	Pośladki i brzuch	Zaciśnij pośladki, wciągnij brzuch	☐
8	Klatka piersiowa	Wciągnij głęboki wdech i przytrzymaj	☐
9	Ręka prawa (cała)	Zaciśnij pięść, napnij całe ramię	☐
10	Ręka lewa (cała)	To samo, druga strona	☐
11	Barki	Unieś barki w stronę uszu	☐
12	Plecy (góra)	Zsuń łopatki do siebie	☐
13	Kark	Wciśnij głowę lekko w poduszkę / oparcie	☐
14	Usta i szczeka	Zaciśnij zęby, naciągnij usta w „sztuczny uśmiech”	☐
15	Oczy i policzki	Mocno zaciśnij powieki, zmarszcz nos	☐
16	Czoło	Unieś brwi wysoko, zmarszcz czoło	☐

03 ⌚ Zasady skuteczności

- ✓ **Codziennie minimum 4 tyg.** — krócej nie automatyzuje umiejętności. Najlepiej o stałej porze (np. rano albo po pracy).
- ✗ **Nie tuż przed snem** — u części osób PMR paradoksalnie pobudza (efekt kontrastu). Test: jeśli po sesji jesteś bardziej pobudzony/-a → przenieś na rano.
- ✓ **Cicho i spokojnie.** Wyłącz telefon, zamknij drzwi. Pierwsze sesje wymagają skupienia — po 2 tyg. możesz robić w głośniejszym otoczeniu.
- ✗ **Nie napinaj „na siłę”** — celem nie jest ból. Jeśli boli — odpuść. Jeśli masz kontuzję jakiejś grupy — pomiń ją.

04 🎯 Cel końcowy — relaksacja na słowo-klucz

Po 4–6 tyg. pojawia się **cue-controlled relaxation**: gdy zauważasz napięcie poza sesją — 1 słowo-klucz + 1 głęboki wdech wystarczą, by w 20–30 s wrócić do rozluźnienia.

MOJE SŁOWO-KLUCZ

np. „spokój”, „odpuść”

05 📅 Dziennik — 4 tygodnie

Ćwicz codziennie (15–20 min) — to warunek skuteczności. **Napięcie PRZED i PO mierz 3 razy w tygodniu** (Pn / Śr / Pt) — to wystarczy do oceny postępu. W pozostałe dni po prostu wykonujesz sesję bez zapisu. Po 4 tyg. porównaj średnie.

TYDZIEŃ	DZIEŃ	GODZ.	NAPIĘCIE PRZED 0– 10	NAPIĘCIE PO 0–10	UWAGI — gdzie najwięcej napięcia? co działało?
1	Pn				
1	Śr				
1	Pt				
2	Pn				
2	Pt				
3	Pn				
3	Pt				
4	Pn				

06 ✨ Po 4 tygodniach — średnie

ŚREDNIO PRZED _____ / 10	ŚREDNIO PO _____ / 10	ŚREDNI SPADEK _____ punktów
------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------