

Zachowania *zabezpieczające*

Rzeczy, które robisz „na wszelki wypadek”. Krótkoterminowo uspokajają — długoterminowo utrzymują lęk.

CZAS: 30 min mapowanie + 3 tyg. redukcji Codzienna praktyka

ŹRÓDŁO: Salkovskis (1991); Clark & Wells (1995); Helbig-Lang & Petermann (2010)

JAK UŻYWAĆ

Zaznacz **zachowania zabezpieczające** rozpoznane u siebie (sekcja 01). Wybierz 3–5 do pracy. Zaplanuj **stopniową redukcję** — od najmniej obciążonego emocjonalnie do najbardziej. Wykonuj 1 redukcję dziennie; obserwuj prognozę vs. wynik.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Zachowania zabezpieczające (ang. *safety behaviors*) to czynności, które wydają się chronić przed zagrożeniem, ale w istocie **utrzymują lęk**. Mechanizm: *nie pozwalają mózgowi sprawdzić, czy zagrożenie jest realne*. „Nie zachorowałem dzięki temu, że codziennie biorę witaminy” — wzmacnia przekonanie o zagrożeniu, nie o sobie. To behawioralny mechanizm **analogiczny do unikania** w fobii, ale subtelniejszy.

01 Lista zachowań — zaznacz, które rozpoznajesz

- ☐ **Wielokrotne sprawdzanie** (drzwi, kucharki, dokumentów, zamków)
- ☐ **Googlowanie objawów** chorób, niebezpieczeństw
- ☐ **Telefony** „czy wszystko ok?” do bliskich
- ☐ **Noszenie „awaryjnych” leków**, butelki wody, telefonu zapasowego
- ☐ **Drobiazgowe planowanie** z minutową precyzją
- ☐ **Pytanie o pozwolenie** na decyzje, które są Twoje
- ☐ **Listy zadań do list** / nadmierne kategoryzowanie
- ☐ **Trzymanie się utartych ścieżek** — te same sklepy, restauracje, trasy
- ☐ **Prośzenie o zapewnienia** („powiedz mi że wszystko będzie dobrze”)
- ☐ **Profilaktyczne wizyty u lekarzy** bez wskazań
- ☐ **Wychodzenie z domu mocno wcześniej** „na wszelki wypadek”
- ☐ **Mentalne przeglądanie** planu wielokrotnie
- ☐ **Wielokrotne czytanie maili** przed wysłaniem
- ☐ **Unikanie niepewnych sytuacji** (nowe miejsca, ludzie, decyzje)
- ☐ **Monitorowanie ciała** — pulsu, oddechu, dolegliwości
- ☐ **Inne** — wpisz poniżej

MOJE INNE ZACHOWANIA ZABEZPIECZAJĄCE

PRZED Zaznacz „kontrolowanie” w życiu codziennym — punkt wyjścia.

Kontrolowanie odpuszczam 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

wszystko
kontroluję

02 ↓ Hierarchia redukcji

Wybierz **5 zachowań** z sekcji 01. Oceń, ile lęku spodziewasz się, gdy z nich zrezygnujesz. Pracuj od najniższego do najwyższego.

#	ZACHOWANIE	LĘK BEZ NIEGO 0– 10	KOLEJNOŚĆ 1 = najpierw
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

03 ✎ Dziennik redukcji — 1 zachowanie / dzień

DZ.	Z CZEGO REZYGNUJĘ	PROGNOZA co najgorszego?	WYNIK co się stało?	WNIOSEK

Klucz: redukcja *stopniowa* i w *pełni*. Częściowa redukcja („sprawdzę tylko 1 raz zamiast 5”) nie wystarczy — mózg dalej myśli, że to to sprawdzanie chroni. Cel: pełne **zaprzestanie** jednego zachowania na raz, aż lęk opadnie. Wtedy bierzesz następne.