

Plan profilaktyki nawrotów

Po terapii GAD. Mapa sygnałów ostrzegawczych + narzędzia do natychmiastowego użycia, gdy pojawia się nawrót.

CZAS: 60 min Pod koniec terapii + przegląd kwartalny

ŹRÓDŁO: Marlatt & Donovan (2005); Witkiewitz & Marlatt (2004); NICE CG113

JAK UŻYWAĆ

Wypełnij **4 części**: (1) moje wyzwalacze, (2) wczesne sygnały ostrzegawcze (żółte flagi), (3) konkretne narzędzia do użycia, (4) plan eskalacji (czerwone flagi). To dokument do *powrotu*, gdy lęk wraca. Trzymaj w widocznym miejscu (zdjęcie w telefonie, na lodówce, w notatniku).

DLACZEGO TO DZIAŁA

Nawroty GAD są **normalne** — 40-60 % pacjentów doświadcza okresów pogorszenia w ciągu 2 lat po zakończeniu terapii. Bez planu nawrót mózg interpretuje jako „*terapia nie zadziałała*”, co prowadzi do bezradności i pogłębia spadek. Plan profilaktyki zmienia narrację: nawrót to **znak**, że **trzeba uruchomić znane narzędzia**, nie powód do paniki. Pacjenci z planem wracają do funkcjonowania **3-5x szybciej** niż bez (Witkiewitz & Marlatt).

01 **Moje wyzwalacze** — sytuacje, które historycznie uruchamiały nasilenie

WYZWALACZE ZEWNĘTRZNE

— zmiany w pracy, konflikty, zdrowie bliskich, finanse

WYZWALACZE WEWNĘTRZNE

— niewyspanie, choroba, hormonalne, samotność

02 **Żółte flagi** — wczesne sygnały, że nawrót się zaczyna

- | | |
|--|---|
| ☐ 2+ noce z gorszym snem / wczesne pobudki | ☐ Powracające „a co jeśli...?” więcej niż 2-3x dziennie |
| ☐ Napięcie mięśniowe (kark, ramiona, szczęka) | ☐ Drażliwość, krótki łont |
| ☐ Powrót sprawdzania / proszenia o zapewnienia | ☐ Ograniczenie aktywności fizycznej |
| ☐ Wycofywanie się ze spotkań / kontaktów | ☐ Powrót do googlowania objawów |

MOJE SPECYFICZNE ŻÓŁTE FLAGI

— jeszcze 2-3 indywidualne sygnały

03 **Moje narzędzia pierwszego rzutu** — co zrobię, gdy zobaczę żółte flagi

CO KONKRETNIE ZROBIĘ	KIEDY / JAK CZĘSTO	JAK ROZPOZNAM, ŻE DZIAŁA

Przykłady: „czas na martwienie 30 min/dzień”, „aktywność fizyczna 30 min × 4 dni”, „ekspozycja pisemna 20 min/dzień przez tydzień”, „defuzja A · «dzięki, umyśle» przy każdej myśli”, „skan ciała przed snem”.

04 **Czerwone flagi** — sygnały, że potrzebuję profesjonalnej pomocy

-  **GAD-7 > 15** przez 2 tyg.
-  **Unikanie pracy / spotkań społecznych** ponad 7 dni
-  **Sen < 5 h** przez 5+ nocy z rzędu
-  **Pierwszy raz pojawiają się myśli samobójcze**
-  **Sięganie po alkohol / leki nasenne** codziennie
-  **Codziennie ataki paniki**

MÓJ PLAN KONTAKTU

— terapeuta + psychiatra + osoba zaufana + telefon zaufania

Pamiętaj: nawrót *nie* znaczy „terapia nie zadziałała”. Znaczy, że uruchomił się stary wzorec — i **masz narzędzia, by go zatrzymać**. Im szybciej zauważysz żółte flagi, tym szybciej narzędzia zadziałają. Przeglądaj ten plan **kwartalnie**, nawet gdy czujesz się dobrze — to wzmacnia pamięć narzędzi w mózgu i przyspiesza reakcję, gdy będzie potrzebna.