

Relaksacja *mięśniowa* (PMR)

Progresywna relaksacja mięśniowa Jacobsona — napinasz i rozluźniasz grupy mięśni. Obniża pobudzenie autonomiczne, redukuje hiperarousal, poprawia sen.

CZAS: 15–20 min na sesję **CHARAKTER:** regulacja, sen

ŹRÓDŁO: Jacobson (1938); Bernstein & Borkovec (1973)

JAK UŻYWAĆ

Położ się lub usiądź wygodnie, oczy zamknięte (lub otwarte, jeśli wolisz). Napnij grupę mięśni przez **5 sekund**, rozluźnij na **15 sekund**, zauważ kontrast. Przejdź przez 16 grup od stóp do głowy. *Wersja skrócona* (3 grupy, 5 min) — gdy nie masz czasu. Praktyka codziennie 15 min przez 2–3 tygodnie daje wyraźny efekt.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Manzoni i wsp. (2008, meta-analiza 27 RCT): PMR **obniża objawy lękowe o 50%**, w PTSD szczególnie skuteczne na hiperarousal i bezsenność. Mechanizm: świadome napięcie pozwala lepiej zauważyć kontrast z rozluźnieniem; powtarzanie cyklu uruchamia reakcję relaksacyjną. Po 4–6 tygodniach mózg uczy się szybkiej relaksacji — wystarczy „skrócona wersja” na opanowanie napięcia w ciągu dnia.

01 Pełna procedura — 16 grup mięśni (15–20 min)

Schemat dla każdej grupy: **napnij 5s → rozluźnij 15s → zauważ kontrast → przejdź dalej.**

Kolejność (od stóp do głowy):

1. Stopy (zginanie palców) · 2. Łydki · 3. Uda · 4. Pośladki
5. Brzuch (wciągnij) · 6. Klatka piersiowa (głęboki wdech) · 7. Plecy
8. Dłonie (pięść) · 9. Przedramiona · 10. Bicepsy · 11. Ramiona
12. Szyja · 13. Czoło (uniesь brwi) · 14. Oczy · 15. Policzki / szczęka · 16. Język

02 Wersja skrócona (3 grupy, 5 min)

Dla braku czasu — w pracy, przed wystąpieniem.

GRUPA 1 • DOLNA POŁOWA

Stopy, łydki, uda, pośladki — napnij wszystkie razem (5s) → rozluźnij (15s).

GRUPA 2 • TUŁÓW + RAMIONA

Brzuch, klatka, ramiona, dłonie — napnij razem (5s) → rozluźnij (15s).

GRUPA 3 • GŁOWA + SZYJA

Twarz, szczęka, szyja — napnij (5s) → rozluźnij (15s). Na końcu — 1 minuta cichego zauważania.

03 Adaptacje dla PTSD

Niektóre osoby z PTSD potrzebują modyfikacji — sprawdź, co Ci pasuje.

OTWARTE OCZY

Jeśli zamknięcie wyzwała lęk lub flashbacki — wykonuj z otwartymi, wzrok na neutralnym punkcie.

POMIJANIE WRAŻLIWYCH OKOLIC

Jeśli trauma fizyczna dotyczyła konkretnej okolicy (szyja, brzuch) — pomiń napięcie tej grupy, tylko zauważ ją w spokoju.

ŁAGODNE NAPIĘCIE

Zamiast *maksymalnego* — średnie, 30-50%. Cel: nauka kontrastu, nie wyczerpanie.

KONTENER PRZY INTRUZYJACH

Jeśli pojawiają się natrętne wspomnienia — przerwij, użyj kontenera lub uziemienia 5-4-3-2-1, wróć następnym razem.

04 Mój dziennik praktyki

3-tygodniowy plan startowy. Notuj napięcie przed i po — zobaczysz zmianę.

#	DATA	PORA DNIA	WERSJA pełna / skrócona	NAPIĘCIE PRZED 0-10	NAPIĘCIE PO 0-10	SEN TEJ NOCY 0-10
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Klucz: Manzoni (2008): „PMR działa najlepiej stosowane **regularnie**. Sporadyczne 30-minutowe sesje są mniej skuteczne niż codzienne 15-minutowe”. Konsekwencja ważniejsza niż intensywność.