

Relaksacja *stosowana* (Öst)

Siedmiostopniowy trening, który redukuje czas rozluźnienia z 15 min do 30 sekund — używalnego w realnej sytuacji lękowej.

CZAS: 10–12 tyg. treningu 1–2× dziennie

ŹRÓDŁO: Öst (1987); Conrad & Roth (2007); Bernstein i wsp. (2000)

JAK UŻYWAĆ

Trening 7-stopniowy, każdy stopień **1–2 tyg. praktyki**: (1) PMR pełny 15 min → (2) skrócony 10 min → (3) tylko rozluźnianie (bez napinania) 5 min → (4) kontrolowane oddechem 2 min → (5) różnicowane (rozluźniaj nieużywane mięśnie) → (6) szybkie 30 s → (7) zastosowanie w sytuacji lękowej. Każdy stopień opanuj, zanim przejdziesz do następnego.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Klasyczne PMR (Jacobsona) wymaga 15 min — *nie* nadaje się do użycia w realnej sytuacji lękowej (np. przed prezentacją). Öst opracował trening, który **skraca czas relaksu do 30 s**, dzięki **warunkowaniu**: powtarzasz słowo-sygnał („rozluźnij”) w pełnym stanie relaksu, dopóki samo słowo nie wywołuje stanu rozluźnienia. Po 10–12 tyg. treningu wielu pacjentów raportuje, że potrafią **rozluźnić ciało w 30 s w autobusie / windzie / na spotkaniu**.

PRZED Zaznacz baseline — jak szybko obecnie potrafisz się rozluźnić.

Szybkość
relaksu

nie
potrafię

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

kontroluję
w 30 s

01 Siedem stopni treningu

1 PMR PEŁNY · 15 MIN

16 grup mięśniowych. Napinasz 5–7 s, rozluźniasz 30–40 s. **1–2 tyg.**

2 PMR SKRÓCONY · 10 MIN

7 grup mięśniowych (łączyz nogi, ramiona, tułów). **1–2 tyg.**

3 TYLKO ROZLUŻNIANIE · 5 MIN

Bez napinania. Sam ruch *rozluźniania*. Tutaj wprowadź słowo-sygnał: „rozluźnij” przy każdym wydechu. **2 tyg.**

4 KONTROLA ODDECHEM · 2 MIN

Tylko oddech: wdech 4 s, na wydechu w głowie „rozluźnij” — całe ciało reaguje. **1 tyg.**

5 RÓŻNICOWANIE · 1 MIN

Rozluźnij *tylko* mięśnie, których nie używasz (np. pisać — ramiona, plecy, szczęką). **1 tyg.**

6 SZYBKIE · 30 S

W codziennych sytuacjach (czekanie na windę, w autobusie) — „rozluźnij” + skan ciała w 30 s. **1 tyg.**

7 ZASTOSOWANIE W SYTUACJI LĘKOWEJ

Używasz w prawdziwej sytuacji, w której odczuwasz lęk: prezentacja, rozmowa, czekanie na wynik. **Cel finalny: redukcja lęku 0–10 w 30 s.**

02 Dziennik treningu — 12 tygodni

TYDZ.	STOPIEŃ 1–7	SESJI w tyg.	CZAS RELAKSU min	NAPIĘCIE PRZED → PO 0–10	OBSERWACJE · GOTOWY/-A DO KOLEJNEGO STOPNIA?
1					
2					
3					
4					
6					
8					
12					

03 × Typowe trudności

„SŁOWO NIE DZIAŁA”

Warunkowanie wymaga 2–3 tyg. powtórzeń w pełnym relaksie. Wytrzymaj 14 dni — pojawi się skojarzenie.

„POMIJAM ETAPY”

Skok ze stopnia 1 do 6 nie zadziała. Każdy kolejny stopień *budowany jest na poprzednim*. Nie spiesz się.

„PRÓBUJĘ W NAPADZIE”

NIE. Najpierw 8–10 tyg. „na sucho”. W napadzie używasz dopiero stopnia 7 — po pełnym treningu.

„ZASYPIAM”

Pierwsze tyg. — normalne. Później siedź zamiast leżeć, oczy półprzymknięte. Trening = nie sen.

PO Po 12 tygodniach — szybkość rozluźniania w sytuacji lękowej.

**Szybkość
PO**

nie
potrafię 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

kontroluję
w 30 s