

Samomonitorowanie *lęku*

Dwa tygodnie obserwacji bez interwencji. Wzorce same się ujawnią — i to one decydują o terapii.

CZAS: 3–5 min × 3 razy dziennie 2 tyg. pomiaru bazowego

ŹRÓDŁO: Borkovec i wsp. (2004); Bouton (2005); Beck (1979)

JAK UŻYWAĆ

Przez 2 tyg. **3 razy dziennie** (rano, w południe, wieczorem) wypełniaj krótkie pole: sytuacja → myśli → ciało → zachowanie + lęk 0–10. **Nie próbuj nic zmieniać.** Cel: zebrać *baseline* — wzorce powtarzające się w czasie. Po 2 tyg. zauważysz: kiedy lęk się nasila, gdzie w ciele, jakie sytuacje go uruchamiają.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Bez baseline — terapia jest „na ślepo”. Pacjent zwykle *nie pamięta*, jak naprawdę wygląda jego tydzień (mózg z lękiem zniekształca pamięć w stronę „wszystko źle”). 2 tyg. **obiektywnych danych** pokazują: (a) lęk ma *rytm* (godziny, dni), (b) wzorce się powtarzają (te same wyzwalacze), (c) są *chwile bez lęku* (mózg ich nie zauważa). Te dane to **materiał**, na którym budujesz interwencję — nie ogólne „mam GAD”.

PRZED Wstępna ocena średniego lęku w tygodniu wyjściowym.

Średni lęk *spokój* (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

ciągły lęk

01 Cztery wymiary do obserwacji

SYTUACJA

Gdzie jestem? Co się dzieje? Kto wokół? Pora dnia? *Konkretnie.*

MYŚLI

Co w głowie? „A co jeśli...?” O czym konkretnie? Jedna, dwa zdania.

CIAŁO

Gdzie czuję? Klatka, brzuch, szyja, ramiona? Napięcie? Pulsowanie? Temperatura?

ZACHOWANIE

Co zrobiłem/-am? Co przestałem/-am robić? Sprawdziłem? Zadzwońłem? Odsunąłem?

02 Dziennik — tydzień 1

DZ.	PORA <i>rano/pld/wiecz</i>	SYTUACJA	MYŚLI	CIAŁO	ZACHOWANIE	LĘK 0–10
<i>Pn</i>						
<i>Wt</i>						
<i>Śr</i>						
<i>Cz</i>						
<i>Pt</i>						
<i>Sb</i>						
<i>Nd</i>						

03 Dziennik — tydzień 2

DZ.	PORA	SYTUACJA	MYŚLI	CIAŁO	ZACHOWANIE	LĘK 0–10
<i>Pn</i>						
<i>Wt</i>						
<i>Śr</i>						
<i>Cz</i>						
<i>Pt</i>						
<i>Sb</i>						
<i>Nd</i>						

04 Analiza wzorców — po 2 tygodniach

NAJCZĘSTSZA PORA DNIA Z WYSOKIM LĘKIEM

NAJCZĘSTSZA MYŚL („A CO JEŚLI...”)

NAJCZĘSTSZA SYTUACJA-WYZWALACZ

NAJCZĘSTSZE MIEJSCE W CIELE

NAJCZĘSTSZE ZACHOWANIE UTRZYMUJĄCE LĘK

— sprawdzanie, googlowanie, pytanie, unikanie

Klucz: pomiar bazowy robisz *raz* przed terapią, nie systematycznie przez lata. To 2 tyg. zwiększonej świadomości — później wystarczy okresowy przegląd (np. co 3 mies.). *Nie* jest celem ciągłe monitorowanie — to *kolejne zachowanie zabezpieczające*. Cel: zebrać dane → na ich podstawie wybrać 2–3 narzędzia terapeutyczne (np. czas na martwienie, ekspozycja na konkretną sytuację) → pracować z nimi.