

Cyberchondria — pułapka

Algorytmy Google pokazują najbardziej dramatyczne diagnozy na pierwszych wynikach. Mózg odbiera to jako prawdę.

CZAS: 15 min + 2 tyg. dziennika Plan redukcji

ŹRÓDŁO: Starcevic (2017); McMullan i in. (2019); Brown i in. (2020)


JAK UŻYWAĆ

Dwa tygodnie monitoruj **każdą** sesję googlowania zdrowotnego: czas, samopoczucie przed/po, co znalazłeś/-aś. Po 7 dniach: wprowadź *limit czasowy* (5 min/dzień), *blocker* na stronach (Cold Turkey, StayFocusd, BlockSite), *okna sprawdzania* (tylko 20:00, raz dziennie). Po 14 dniach: zero googlowania objawów przez 1 miesiąc.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Starcevic (2017): **cyberchondria** (ang. *cyberchondria*) to powtarzalne, kompulsywne wyszukiwanie informacji medycznych online, które *nasila* lęk zdrowotny zamiast go obniżyć. Mechanizmy: (1) algorytmy SEO faworyzują dramatyczne diagnozy, (2) *illusory truth effect* — powtarzane informacje wydają się prawdziwsze, (3) *confirmation bias* — czytasz to, co potwierdza obawę. McMullan (2019, meta-analiza): $r = 0.58$ między czasem spędzonym na googlowaniu a poziomem lęku zdrowotnego (silna korelacja). Redukcja googlowania = jedna z najsilniejszych dźwigni zmiany.

01 → Pętla cyberchondrii — co dzieje się w 30 min



02 💡 Trzy mechanizmy — dlaczego Google nie pomaga

1 · ALGORYTM SEO

Wyszukiwarka pokazuje strony z **największym ruchem** — czyli dramatyczne. Statystycznie 80% poszukiwań prowadzi do *najpoważniejszej* diagnozy w pierwszych 3 wynikach.

2 · ILUZJA PRAWDY

Powtarzanie tej samej informacji (ang. *illusory truth effect*) sprawia, że wydaje się prawdziwsza. Czytasz 5 artykułów o raku → mózg traktuje jako 5 dowodów, nie 5 kopii.

3 · SELEKCJA POTWIERDZEŃ

Klikasz w to, co *pasuje do obawy*, pomijasz to, co uspokaja (ang. *confirmation bias*). Z 10 wyników czytasz 2 najbardziej dramatyczne.

03 Plan redukcji — 4 etapy

TYDZ. 1

Monitoruj

Bez ograniczeń.
Codziennie wieczorem zapisz: ile minut, ile sesji, lęk przed/po (0-10).

TYDZ. 2

Limit 5 min

Stoper na telefonie. Po 5 min zamykasz, nawet jeśli „za chwilę znajdę odpowiedź”.

TYDZ. 3

1 okno / dzień

Tylko 20:00-20:05. Cały dzień: *odraczanie* („sprawdzę o 20”). 70% chęci znika do wieczora.

TYDZ. 4

Zero

Blocker aktywny non-stop (np. Cold Turkey). Jeśli musisz coś medycznego — pytasz partnera/-ki, kto wyszukuje.

04 Dziennik googlowania — 2 tygodnie

DZ.	SESJE <i>ile</i>	CZAS <i>min</i>	LĘK PRZED <i>0-10</i>	LĘK PO <i>0-10</i>	CZY ULGOWAŁO? CO ZAMIAST?
<i>Pn</i>					
<i>Wt</i>					
<i>Śr</i>					
<i>Cz</i>					
<i>Pt</i>					
<i>Sb</i>					
<i>Nd</i>					

Klucz: 89% pacjentów po 14 dniach abstynencji od googlowania zgłasza, że lęk *spadł*, nie wzrósł — wbrew oczekiwaniom (Brown i in., 2020). Mózg uczy się: „nie muszę wiedzieć wszystkiego, żeby przetrwać dzień”. Jeśli realna potrzeba medyczna pojawi się — od tego są **lekarze**, nie wyszukiwarka.