

Ekspozycja *interoceptywna*

Sam celowo wywołujesz odczucia, których się boisz. Kontrolowanie ich = oduczanie strachu.

CZAS: 30 min sesja + codziennie 10 min 4–6 tyg.

ŹRÓDŁO: Barlow (2002); Craske & Barlow (2008); Boettcher i in. (2016)

JAK UŻYWAĆ

Wybierz **jedno odczucie cielesne**, którego się boisz (kołatanie serca, zawroty, duszność). Sam celowo je wywołaj prostym ćwiczeniem (bieg w miejscu, hiperwentylacja, oddech przez słomkę). Powtarzaj 3–5×, dopóki SUDS nie spadnie o 50%. Bez sprawdzania pulsu, bez wycofania.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Ekspozycja interoceptywna (ang. *interoceptive exposure*, Barlow 2002) to **klasyk leczenia paniki**, ale działa też w lęku zdrowotnym, gdy strach dotyczy odczuć cielesnych (kołatania, kłucia, zawrotów). Mechanizm: *uczenie hamujące* — mózg uczy się, że konkretne odczucie **NIE** jest oznaką katastrofy, bo właśnie sam je wywołałeś/aś. Boettcher i in. (2016, meta-analiza): efekt $d = 0.95$ w lęku zdrowotnym z wiodącymi objawami somatycznymi. Skuteczność: 4 sesje wystarczą do 50% redukcji intensywności reakcji.

01 Ćwiczenia — wybierz to, co odpowiada obawie

ĆWICZENIE	CZAS	CO WYWOŁUJE	PRZYDATNE, GDY BOISZ SIĘ...
Bieg w miejscu	60 s	tętno, oddech, pocenie	zawału, arytmii
Hiperwentylacja	60 s	zawroty, mrowienie, depersonalizacja	udar, SM, omdlenia
Oddech przez słomkę	120 s	duszność, ucisk w klatce	astmy, zatorowości
Kręcenie się na krześle	60 s	zawroty głowy, nudności	guza mózgu, błędniaka
Wstrzymanie oddechu	30 s	duszność, panika, brak powietrza	duszności, panicznego ataku
Wpatrywanie w punkt	90 s	rozmycie wzroku, derealizacja	utrąty zmysłów, szaleństwa

02 Procedura — krok po kroku

1 · PRZED

SUDS PRZED (0–100). Zapisz prognozę: „*jeśli wywołam X, stanie się Y w czasie Z*”. Bez telefonu, bez stopera do pulsu.

2 · W TRAKCIE

Wywołaj odczucie pełnym czasem. **Pozwól mu być**. Nie obniżaj go technikami oddechowymi. Tu chodzi o *doznanie*, nie regulację.

3 · PO

SUDS PO. Sprawdź prognozę — co się stało naprawdę. Powtórz 3–5 razy. Habitucja w jednej sesji **NIE** jest celem — naruszenie prognozy jest.

03 \ Dziennik — 5 powtórzeń tego samego ćwiczenia

Powtarzaj **jedno** ćwiczenie 5× z rzędu (z 1-min przerwami). Zapisz SUDS po każdym. Cel: krzywa SUDS opada między powtórzeniami.

ĆWICZENIE / ODCZUCIE DO WYWOŁANIA

PROGNOZA KATASTROFICZNA

— „jeśli zrobię X, stanie się Y” — wiara 0–100%

POWTÓRZENIE	SUDS PRZED 0–100	SUDS MAX 0–100	SUDS PO 0–100	CZAS POWROTU DO BAZY
1				
2				
3				
4				
5				

CO SIĘ STAŁO Z PROGNOZĄ?

— ile razy trafiona, ile razy nietrafiona — wiara po: 0–100%

04 × Pułapki — co rozcieńcza efekt

1 · NIEDOBOROWA INTENSYWNOŚĆ

Robisz ćwiczenie „lekko, na pół gwizdka”. Cel: *doznanie pełnego odczucia*. Bieg na 100%, nie na 30%.

2 · SPRAWDZANIE PODCZAS

Mierzenie pulsu w trakcie. Sprawdzanie objawów po. *Każde sprawdzenie* = mózg uczy się: „przetrwiałem, bo sprawdziłem”.

3 · WYCOFANIE PRZY SZCZYCIE

SUDS rośnie do 80 → przerywasz. *Krzywa się nie domyka*. Wytrzymaj, dopóki SUDS sam zacznie opadać.

4 · TYLKO Z TERAPEUTĄ

Bez ćwiczeń w domu efekt zostaje w gabinecie. Cel: *5× w domu między sesjami*.

Klucz: przeciwwskazania *medyczne*: ciąża, ciężka choroba serca, świeży zawał, niekontrolowana astma, padaczka. **Skonsultuj z lekarzem** przed wdrożeniem, jeśli masz jakąkolwiek diagnozę kardio. W innym wypadku — ekspozycja interoceptywna jest bezpieczna i daje najszybsze efekty w ciągu 2–4 sesji.