

Model *Salkovskisa*

Pięć ogniw jednego błędnego koła. Każde z nich można rozbić — i wtedy całe koło traci napęd.

CZAS: 20 min 1 sesja + zadanie domowe **ŹRÓDŁO:** Warwick & Salkovskis (1990); Salkovskis i in. (2002)


JAK UŻYWAĆ

Przeczytaj model krok po kroku. Dla każdego z 5 ogniw — wypisz **swoje** przykłady z ostatnich 2 tygodni. Na końcu narysuj własną mapę 5 mechanizmów. To podstawa *indywidualnej formulacji*, którą wrócimy do sesji.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Model Salkovskisa (1990) to **najlepiej zwalidowany** opis mechanizmów lęku zdrowotnego — fundament wszystkich aktualnych protokołów CBT (Cooper 2017; Olatunji 2014). Pacjent, który *widzi swoje koło*, przestaje walczyć z objawami i zaczyna pracować ze sprawdzaniem, interpretacjami i unikaniem. Zrozumienie modelu = redukcja lęku o 15-25% jeszcze przed właściwą interwencją (Bouman & Visser, 2014).

01 Pięć ogniw — diagram modelu



02 Pięć ogniw — krótko

1 • Katastroficzna interpretacja. Mózg domyślnie wybiera najgorszy scenariusz. „Ból głowy = guz” zamiast „odwodnienie”.

2 • Selektywna uwaga. Skanujesz ciało. Im uważniej szukasz, tym więcej znajdziesz — bo ciało zawsze coś robi.

3 • Sprawdzanie ciała. Macanie, mierzenie, oglądanie w lustrze. Ulga 5-60 min, lęk wraca silniejszy.

4 • Poszukiwanie zapewnienia. Lekarze, Google, bliscy. Każde „nic ci nie jest” działa tylko godziny.

5 • Unikanie. Druga strona medalu sprawdzania: omijanie szpitali, sportów, filmów o chorobach. Każde unikanie utwierdza mózg, że zagrożenie jest realne.

03 Moja mapa — 5 ogniw z ostatnich 2 tygodni

Dla każdego ogniwa wpisz **konkretny przykład** z ostatnich 14 dni. Im konkretniej — tym łatwiej rozbić koło na sesji.

#	OGNIWO	MÓJ KONKRETNY PRZYKŁAD data, kontekst, dokładna myśl / zachowanie
1	Interpretacja <i>„to musi być...”</i>	
2	Selektywna uwaga <i>co skanuję, jak często</i>	
3	Sprawdzanie <i>co dotykam, mierzę</i>	
4	Zapewnienie <i>kogo pytam, co googluję</i>	
5	Unikanie <i>czego nie robię</i>	

04 Gdzie rozbić koło — kolejność interwencji

NAJPIERW · SPRAWDZANIE

Najsilniejszy efekt. Redukcja sprawdzania = redukcja całego cyklu. Bez tego inne interwencje są krótkotrwałe.

POTEM · INTERPRETACJA

Reinterpretacja odczuć — gdy sprawdzanie zredukowane, można zacząć kwestionować katastroficzne myśli.

NA KOŃCU · UNIKANIE

Ekspozycja stopniowa — gdy lęk podstawowy spadł, można wracać do unikanych sytuacji.

Klucz: model Salkovskisa pokazuje, że problem NIE jest w *obecności* myśli o chorobie (te ma większość ludzi), tylko w **5 zachowaniach** które myśl podtrzymują. Zmieniasz zachowania → myśl traci napęd. To zupełnie inna logika niż „muszę przestać się bać” — bo bać się przestaniesz *w wyniku* zmiany zachowań, nie odwrotnie.