

Naruszenie *oczekiwania*

Mózg uczy się nowego, gdy realność wyraźnie zaprzecza prognozie. Im większa rozbieżność — tym lepsze uczenie.

CZAS: 30 min planu + 60 min eksperyment 1 sesja + 1 tydzień przerwy

ŹRÓDŁO: Craske i in. (2014); Bennett-Levy (2004); Salkovskis (1991)

JAK UŻYWAĆ

Sformułuj **konkretną prognozę katastroficzną** („jeśli przebiegnę 1 km, dostanę zawału w ciągu 30 min”). Wykonaj zachowanie. Po zakończeniu porównaj *prognozę z tym, co się stało*. Im większa rozbieżność, tym silniej mózg uczy się nowego skojarzenia.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Klasyczny model habituacji (powolne wygasanie lęku) został zastąpiony przez **uczenie hamujące** (ang. *inhibitory learning*, Craske i in. 2014). Mózg *nie zapomina* starego skojarzenia („ból klatki = zawał”), tylko uczy się *konkurencyjnego* („ból klatki + ruch + brak konsekwencji = bezpieczne”). Klucz uczenia: **maksymalne naruszenie prognozy** (ang. *expectancy violation*). Im bardziej wynik różni się od oczekiwania, tym silniejsze nowe skojarzenie. Skuteczność: $d = 1.1$ vs $d = 0.6$ dla klasycznej ekspozycji (Craske 2014).

01 Schemat — 4 kroki eksperymentu



Im większa różnica między 1 a 3 — tym silniej mózg uczy się nowego skojarzenia

02 Przykład — eksperyment z bólem klatki

KROK	TREŚĆ
Prognoza	„Jeśli pobiegam 10 min, ból klatki nasili się 7/10 → zawału dostanę w ciągu godziny” — wiara: 75%
Zachowanie	Bieg 10 min średnim tempem. Bez sprawdzania pulsu, bez telefonu do partnera/-ki.
Obserwacja	Ból klatki 3/10 podczas biegu, 0/10 po 5 min odpoczynku. Brak innych objawów. Zawału nie ma.
Wniosek	Prognoza nietrafiona. Ból klatki przy wysiłku = napięcie mięśni, nie serce. Wiara w prognozę: 75% → 30%.

03 Mój eksperyment — sformułuj i wykonaj

A • KONKRETNĄ PROGNOZĄ

— „jeśli zrobię X, stanie się Y w ciągu Z minut”

B • WIARA W PROGNOZĘ PRZED

— 0–100%

C • LĘK PRZED

— 0–10

D • ZACHOWANIE DO WYKONANIA

— bez zachowań zabezpieczających (puls, telefon, wycofanie)

E • OBSERWACJA — CO STAŁO SIĘ NAPRAWDĘ?

— konkretnie, z liczbami

F • WIARA W PROGNOZĘ PO

— 0–100%

G • LĘK PO

— 0–10

04 4 zasady wzmacniania uczenia (Craske 2014)

1 • MAKSYMALNE NARUSZENIE

Im **większa** różnica między prognozą a rzeczywistością, tym lepsze uczenie. Wymyśl odważniejsze zachowanie, jeśli można.

2 • WIELE KONTEKSTÓW

Powtórz eksperyment w różnych miejscach (dom, park, sklep). Mózg uczy się: „bezpieczne wszędzie”, nie tylko „bezpieczne na sesji”.

3 • BEZ ZABEZPIECZEŃ

Bez sprawdzania pulsu, telefonu, wycofania w razie czego. *Każde zabezpieczenie rozcieńcza uczenie* — mózg zapisuje „przetrwiałem dzięki zabezpieczeniu”.

4 • ETYKIETY

Po eksperymencie **wypowiedz głośno**: „Sprawdzone — moja prognoza była błędna”. Słowne nazwanie wzmacnia konsolidację.

Klucz: eksperyment *nie* ma „udowodnić, że jesteś zdrowy/-a” — ma **naruszyć konkretną prognozę**, którą sformułowałeś/-aś na piśmie. Pacjent, który zrobił 5 eksperymentów z naruszeniem oczekiwań, ma 3× wyższą szansę utrzymać efekty po 12 mies. niż pacjent po klasycznej ekspozycji (Craske & Mystkowski, 2006). „Im więcej dziur w prognozach katastroficznych — tym mniej napędu dla lęku”.