

# Redukcja *sprawdzania*

*Sprawdzanie daje ulgę na minuty. Wzmacnia lęk na lata. Stopniowa redukcja przerywa to koło.*

**CZAS:** 10 min planowania + 4 tyg. wdrożenia Codzienne monitorowanie

**ŹRÓDŁO:** Salkovskis (1990); Furer & Walker (2008); Starcevic (2017)

## JAK UŻYWAĆ

Wypisz **swoje** zachowania sprawdzające (macanie, mierzenie, lustro, Google). Oszacuj częstotliwość. Ustal **gradualną** redukcję o 50% co tydzień (NIE „od jutra zero”). Monitoruj 4 tygodnie w tabeli.

## DLACZEGO TO DZIAŁA

Każdy akt sprawdzenia daje krótkotrwałą ulgę (5–60 min), ale działa jak **wzmocnienie negatywne** (ang. *negative reinforcement*): mózg uczy się, że „bez sprawdzenia byłoby gorzej” → wzrost lęku przy próbie zaniechania. Cyberchondria (ang. *cyberchondria*, Starcevic 2017): googlowanie objawów **nasila** lęk w 89% przypadków — algorytmy wyświetlają najbardziej dramatyczne diagnozy. Redukcja sprawdzania = pojedyncza najsilniejsza interwencja w lęku zdrowotnym (d = 0.92, Cooper 2017).

01

## Inwentarz moich zachowań sprawdzających

Wypisz **konkretne** zachowania — nie „dużo myślę o zdrowiu”, ale „macam węzły szyjne 5×/dzień”. Bez konkretnego nie da się zredukować.

**ZACHOWANIE** konkretnie, gdzie, jak

**CZĘSTOTLIWOŚĆ**  
razy/dzień lub /tydz.

**ULGA PO (0–10)**  
jak silna, jak długa

**CEL TYGODNIA 1**  
–50%

02

## Typowe zachowania — czy któreś brzmią znajomo?

### CIAŁO — FIZYCZNE

Macanie węzłów, mierzenie pulsu, pomiar ciśnienia 3×/dzień, oglądanie pieprzyków, badanie piersi codziennie, oglądanie języka w lustrze, ważenie się.

### INTERNET — GOOGLE

Wpisywanie objawów, czytanie forów medycznych, oglądanie filmów na YouTube o chorobie, sprawdzanie statystyk śmiertelności, porównywanie z opisami innych pacjentów.

### INNI — ZAPEWNIANIE

Pytanie bliskich „czy ja źle wyglądam?”, telefon do rodzica, wysyłanie zdjęć znamion znajomym, prośba o opinię partnera o pieprzyku, pytania w pracy.

### LEKARZE — SYSTEM

Drugie i trzecie opinie, wizyty u różnych specjalistów, prywatne badania na własną rękę, prywatne USG „dla świętego spokoju”, wracanie z tym samym objawem co miesiąc.

### 03 Plan 4-tygodniowej redukcji

Stopniowo, NIE z dnia na dzień. „Zero od jutra” daje nawrót w 80% przypadków (Salkovskis 1990). Realistyczny plan = trwała zmiana.

|                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TYDZ. 1</b><br>-50%<br>Jeśli sprawdzasz 10×/dzień → 5×. Zapisuj każdy przypadek. Pierwszy tydzień: niepokój wzrasta — to <i>normalne</i> . | <b>TYDZ. 2</b><br>-75%<br>10×/dzień → 2×. Wprowadź <i>okna sprawdzania</i> : tylko o 10:00 i 18:00. Reszta dnia — odraczaj. | <b>TYDZ. 3</b><br>-90%<br>10×/dzień → 1×. Jedno okno (np. wieczorem, 5 min). Reszta — odraczaj 30 min, w międzyczasie zajmij się czymś. | <b>TYDZ. 4</b><br><i>0×</i><br>Pełna abstynencja od sprawdzania. Lęk osiąga szczyt w 1–3 dniu, potem <i>spada</i> . To dane Salkovskisa — nie metafora. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 04 Monitoring — tydzień próbny

Każdego wieczoru zapisz: ile razy sprawdziłem/-am, jak silny był lęk średnio, czy odroczyłem/-am chęć sprawdzenia (T/N).

| DZ.       | SPRAWDZANIE<br>CIAŁA<br><i>razy</i> | GOOGLE<br><i>min</i> | LĘK ŚR.<br><i>0–10</i> | ODROCZENIA<br><i>ile</i> | CO MI POMOGŁO |
|-----------|-------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|---------------|
| <i>Pn</i> |                                     |                      |                        |                          |               |
| <i>Wt</i> |                                     |                      |                        |                          |               |
| <i>Śr</i> |                                     |                      |                        |                          |               |
| <i>Cz</i> |                                     |                      |                        |                          |               |
| <i>Pt</i> |                                     |                      |                        |                          |               |
| <i>Sb</i> |                                     |                      |                        |                          |               |
| <i>Nd</i> |                                     |                      |                        |                          |               |

**Klucz:** w pierwszych 3–5 dniach lęk *rośnie* — to nie znaczy, że plan nie działa, to znaczy, że **działa**. Mózg protestuje, że odbierasz mu znajome narzędzie. Wytrzymaj 7 dni — krzywa lęku zacznie opadać. Większość pacjentów osiąga redukcję 75% sprawdzania w 4 tygodnie (Furer & Walker, 2008).