

Reinterpretacja *odczuć*

Odczucie zostaje. Zmienia się tylko etykieta, którą mu nadajesz — i to wystarczy, by lęk opadł.

CZAS: 15 min na epizod Codziennie, gdy pojawia się objaw

ŹRÓDŁO: Salkovskis (1996); Wells (1997); Furer & Walker (2008)

JAK UŻYWAĆ

Gdy zauważysz **niepokojące odczucie** w ciele, NIE Google. Zamiast tego wypisz: 1) odczucie, 2) pierwszą interpretację katastroficzną, 3) *trzy alternatywy* — niezagrażające wyjaśnienia, 4) najbardziej prawdopodobne tłumaczenie. Skala lęku przed i po.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Salkovskis (1996): w lęku zdrowotnym nie problem jest w *odczuciu*, ale w **interpretacji**. Mózg domyślnie wybiera najbardziej dramatyczne wyjaśnienie (ang. *catastrophic misinterpretation*) — to skrót poznawczy, nie fakt. Wymuszone generowanie 3 alternatyw **łamie ten skrót**: po 2–3 tygodniach mózg sam zaczyna proponować neutralne wyjaśnienia. Skuteczność restrukturyzacji w lęku zdrowotnym: $d = 0.85$ (Olatunji i in., 2014).

01 Słownik „szumu” — normalne odczucia

Ciało **zawsze** coś robi. To 8 najczęstszych „szumów” — odczuć fizjologicznych, które są kompletnie normalne, a w lęku zdrowotnym czyta się jako oznaki choroby.

Kłucie w klatce → najczęściej napięcie mięśni międzyżebrowych, nerwoból, refluks. Realny zawał: tępy ucisk, promieniujący do ramienia.

Ból głowy → odwodnienie, napięcie karku, zaciskanie szczęki. Guz: postępujący, z neurologicznymi objawami.

Mrowienie kończyn → hiperwentylacja, ucisk nerwu (zła pozycja). SM: nagłe, jednostronne, z postępem.

Zawroty głowy → niskie ciśnienie po wstaniu, niedosypianie, hiperwentylacja. Udar: nagłe, z mową, drętwieniem.


Kołatanie serca → kofeina, stres, premenstrual. Arytmia: regularna, długotrwała, z omdleniami.

Powiększone węzły → infekcja (nawet bezobjawowa) — tygodnie. Chłoniak: trwały, twardy, bezbolesny, >2 cm.

Zmiany na skórze → 80% to znamiona, brodawki, łojotokowe. Czerniak: ABCDE — asymetria, brzeg, kolor, średnica, ewolucja.

Zmęczenie → niedosypianie, anemia, depresja, stres. Choroba: postępujące, z gorączką, utratą wagi.

02 Metoda 3 alternatyw — schemat



PRZED Zaznacz, zanim zaczniesz reinterpretację.

Lęk teraz spokoj 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

max lęk

03 ✎ **Tvoja reinterpretacija**

1 • ODCZUCIE

— gdzie, jakie, intensywność 0–10

2 • PIERWSZA INTERPRETACJA

— ta dramatyczna, którą mózg podsuwa

3 • TRZY ALTERNATYWNE WYJAŚNIENIA

— niezagrażające, codzienne przyczyny

A	B	C

4 • NAJBARDZIEJ PRAWDOPODOBNE TŁUMACZENIE

— co dziś jadłem/-am, spałem/-am, robiłem/-am?

04 ✕ **Pułapki w reinterpretacji**

PUŁAPKA 1 • „A JEŚLI JEDNAK...”

Zamiast generować alternatywy, mózg dorzuca scenariusze. *Reinterpretacja to nie debata* — wpisz 3 wyjaśnienia i zakończ, nawet jeśli nie są w 100% przekonujące.

PUŁAPKA 2 • GOOGLE JAKO WERYFIKATOR

„Sprawdzę tylko, czy moja alternatywa jest poprawna” — to powrót do sprawdzania. *Zaufaj sobie* — wypisanie 3 alternatyw to wystarczająca praca.

PUŁAPKA 3 • WYMUSZANIE WIARY

„Muszę uwierzyć, że to nic poważnego” → napięcie rośnie. Cel: *traktować alternatywy poważnie*, nie wierzyć w nie na 100%.

PUŁAPKA 4 • TYLKO GDY ŹLE

Ćwicz *codziennie*, nawet gdy lęk jest niski — wtedy nawyk się utrwala. W napadzie pojawi się automatycznie.

PO Zaznacz po wypisaniu 3 alternatyw. Spadek o 2 punkty = sukces.

Lęk teraz spokoj 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

max lęk