

Dekatastrofizacja *ataku paniki*

Schodzenie po drabinie „i co by się stało?” Najgorsze okazuje się dyskomfortem, nie katastrofą.

CZAS: 10-15 min Praca w gabinecie + domu **ŹRÓDŁO:** Burns (1980); Clark (1986); Wells (1997)

JAK UŻYWAĆ

Wybierz **konkretny** lęk z dziennika ataków (nie ogólne „boję się ataku”). Zapisz w formie „*Boję się, że...*”. Pytaj „**I co by się stało?**” do każdej kolejnej odpowiedzi, aż dojdiesz do końca drabiny. Końcem jest odpowiedź, do której nie ma już „i co wtedy?”.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Według modelu Clarka (1986) ataki napędza nie samo odczucie, lecz *katastroficzna interpretacja*. Abstrakcyjny lęk („stanie się coś strasznego”) jest mocniejszy niż konkretny („poczuję zawroty i wstanę”). Schodzenie po drabinie zmusza mózg do konkretyzacji — odsłania **ubóstwo rzeczywistej katastrofy**. Adresuje też lęk *antycypacyjny* (ang. *anticipatory anxiety*), który u wielu pacjentów ogranicza bardziej niż same ataki.

01 Trzy ruchy techniki

1 · DOŚWIADCZANIE

„Ile ataków już miałem/-am?”

Ile razy zemdlałem/-am? **Zero.** Ile

razy dostałem/-am zawału? **Zero.**

Ile razy umarłem/-am? **Zero.**

Każdy poprzedni atak obalił prognozę.

2 · REINTERPRETACJA

„Co to naprawdę jest?”

Kołatanie = adrenalina, nie zawał.

Duszność = za dużo tlenu, nie

uduszenie. Zawroty =

hiperwentylacja, nie udar. *Objaw fizjologiczny, nie sygnał katastrofy.*

3 · NAJGORSZY SCENARIUSZ

„Co najgorszego naprawdę?”

Dyskomfort. Wstyd. Niewygoda.

Minie. Zawsze mijał. *Tym jest*

„najgorszy” scenariusz —

nieprzyjemnym, ale przejściowym.

02 ↓ Drabina — jak to wygląda w praktyce

L Wyjściowy lęk: „Boję się, że dostanę ataku w sklepie i zemdleję na oczach wszystkich.”

↓ **I co by się stało?** „Upadnę. Ludzie będą patrzeć. Może wezwą karetkę.”

↓ **I co by się stało?** „Pojadę na pogotowie. Zrobią mi EKG.”

↓ **I co by się stało?** „Powiedzą, że to atak paniki. Wrócę do domu.”

↓ **I co by się stało?** „Będzie mi głupio przed ekspedientką.” ← **koniec drabiny**

Najgorszy realny scenariusz: wizyta na pogotowiu + chwila wstydu. Nie zawał. Nie śmierć. Nie szaleństwo. *Nieprzyjemne — ale do przeżycia.*

03 Moja drabina — krok po kroku

Wybierz **jeden** konkretny lęk z ostatnich zapisów w dzienniku. Schodź po drabinie aż do końca — pytaj „i co by się stało?” do każdej kolejnej odpowiedzi.

WYJŚCIOWY LĘK

— „Boję się, że...” — konkretny, nie ogólny

KROK 1 — I CO BY SIĘ STAŁO?

— pierwsza konsekwencja

KROK 2 — I CO DALEJ?

— rozwijaj scenariusz

KROK 3 — I CO NAJGORSZEGO NAPRAWDĘ?

— koniec drabiny

JAK NAPRAWDĘ BYM SOBIE PORADZIŁ/-A?

— jakie zasoby, kto pomoże

=== Skala PRZED/PO ===

PRZED Zaznacz przekonanie, ZANIM wykonasz ćwiczenie.

Wiarę w katastrofę 0% — nie wierzę 100% — pewne
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

PO Po dotarciu do końca drabiny — zaznacz ponownie.

Wiarę w katastrofę 0% — nie wierzę 100% — pewne
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Klucz: technika działa *tylko*, gdy dochodzisz do końca drabiny. Nie zatrzymuj się na „zemdleję” — kontynuuj: „i co wtedy? ktoś wezwie pomoc. i co wtedy? obudzę się. i co wtedy? będzie mi głupio.” Bez dotarcia do końca technika nie przebija katastrofizacji. Ćwicz przed sytuacjami wyzwalającymi i po ataku — do przepracowania wniosków.