

Dziennik *ataków paniki*

Zapis 7 wymiarów po każdym ataku. Po 2 tygodniach „losowe” ataki przestają być losowe.

CZAS: 5 min po ataku Minimum 2 tygodnie **ŹRÓDŁO:** Barlow & Craske (1989, MAP-4); Kanfer (1970)

JAK UŻYWAĆ

Po **każdym** ataku — w ciągu 1–2 godzin, nie z pamięci wieczornej — wypełnij jeden wiersz tabeli. **7 wymiarów:** data/godzina, sytuacja, wyzwalacz, objawy 0–10, myśli, zachowania, lęk maks. (skala SUDS 0–100). Po 2 tygodniach przeanalizuj wzorce.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Bez danych formuła jest domysłem, a plan terapii — strzałem w ciemno. Trzy efekty: **(1) konkretyzacja** — „ciągle mam ataki” staje się policzalne „3 w tygodniu”; **(2) odsłanianie wzorców** — kofeina, upał, zmęczenie, kłótnie przestają być „losowe”; **(3) dystansowanie** — akt pisania przesuw Cię z roli ofiary do roli obserwatora.

01 Co dokładnie zapisać — 7 kolumn dziennika

1 · DATA & GODZINA

Dokładny czas startu ataku. Pora dnia ujawnia rytmy (rano, wieczorem, po posiłku).

2 · SYTUACJA

Gdzie byłem/-am, co robiłem/-am. Konkret: „*metro, w drodze do pracy*”, nie „w mieście”.

3 · WYZWALACZ

Co poprzedziło? Bodziec cielesny (kawa, gorąco, wysiłek), myśl, obraz, sytuacja. Często nie ma — i to jest informacja.

4 · OBJAWY (3 NAJSILNIEJSZE)

Wybierz 3 najsilniejsze, oceń 0–10. Np. *kołatanie 9, duszność 7, mrowienie 5*.

5 · KATASTROFICZNA MYŚL

Dosłownie: „*zemdleję*”, „*dostanę zawału*”, „*zwariuję*”. Cytat, nie opis.

6 · CO ZROBIŁEM/-AM

Konkretne zachowania: wyszedłem/-am, zadzwoniłem/-am, wziąłem/-am tabletkę, usiadłem/-am. To są *zachowania zabezpieczające*.

7 · LĘK MAKSYMALNY — SKALA SUDS 0–100

Najsilniejszy moment ataku, oceniony od 0 (zero lęku) do 100 (najgorszy w życiu). SUDS (ang. *Subjective Units of Distress Scale*) — Wolpe (1969). To kluczowa miara redukcji: po terapii spada zwykle z 80–100 do 30–50.

02 Dziennik — 14 dni

Wypełniaj wyłącznie po ataku. Brak ataku = pusty wiersz (nie zostawiaj „dla porządku”). Po 2 tyg. wróć z arkuszem na sesję.

DATA + godz.	SYTUACJA gdzie/co robiłem-am	WYZWALACZ co poprzedziło	OBJAWY (0–10) 3 najsilniejsze	MYŚL KATASTROFICZNA „boję się że...”	CO ZROBIŁEM-AM zachowanie	SUDS 0–100

03 Analiza po 2 tygodniach — jakie wzorce widzę?

POWTARZAJĄCE SIĘ WYZWALACZE

— co najmniej 2 razy

NAJCZĘSTSZA MYŚL KATASTROFICZNA

— powtarza się?

Klucz: niewypełnianie dziennika to *sygnał oporu lub unikania* — nie pomijaj tego, porozmawiaj o tym z terapeutą. Dane z dziennika zasilają potem dekatastrofizację (pkt 5) i plan ekspozycji interoceptywnej (kolejne kolumny 4, 5, 6 wskazują, co konkretnie ćwiczyć).