

Ekspozycja *interoceptywna*

Celowe wywołanie strasznych odczuć w bezpiecznym kontekście. Mózg uczy się: to nieprzyjemne, ale niegroźne.

CZAS: 15–30 min 3–5× w tygodniu, 2–4 tyg.

ŹRÓDŁO: Barlow & Craske (1989, MAP-4); Craske i wsp. (2014)

JAK UŻYWAĆ

Wybierz 2–3 odczucia, których najbardziej się boisz (z dziennika). Dla każdego dobierz **ćwiczenie wywołujące dokładnie to odczucie**. Powtarzaj 3–5×/tydz., aż lęk na skali SUDS spadnie poniżej 30/100 dla danego ćwiczenia. **Zasada kluczowa:** bez głębokich oddechów, bez „uspokajania się”, bez sprawdzania, bez dystrakcji.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Po wielu atakach odczucia cielesne (kołatanie, duszność, zawroty) stały się **bodźcem warunkowym** wywołującym lęk. Powtarzalne, celowe wywoływanie wygasza warunkowanie. Mechanizm to **uczenie hamujące** (ang. *inhibitory learning*) — Craske i wsp. (2014): stare skojarzenie nie znika, ale powstaje konkurencyjne, silniejsze („odczucie → nic groźnego”). Wielkość efektu $d = 0,90\text{--}1,50$ — jedna z najwyższych w psychoterapii zaburzeń lękowych.

01 Katalog ćwiczeń — co wywołuje co

ĆWICZENIE	CZAS	CO WYWOŁUJE	ADRESUJE LĘK PRZED
Hiperwentylacja <i>szybki, głęboki oddech</i>	60 s	Duszność, mrowienie, zawroty, nierealność	„zemdleję”, „uduszę się”
Bieganie w miejscu <i>intensywny trucht</i>	60–90 s	Kołatanie serca, pocenie, ciężki oddech	„dostanę zawału”
Kręcenie się na krześle <i>obroty wokół osi</i>	60 s	Zawroty, mdłości, dezorientacja	„zemdleję”
Oddychanie przez słomkę <i>wąska słomka, zatkany nos</i>	120 s	Duszność, ucisk w klatce, panika oddechowa	„uduszę się”
Wstrzymanie oddechu <i>na ile dasz radę</i>	30–60 s	Duszność, ucisk w klatce	„uduszę się”
Wpatrywanie się w punkt <i>lub w lustro</i>	120 s	Nierealność, depersonalizacja, „nie jestem tu”	„zwariuję”, „stracę kontrolę”
Napinanie ciała <i>całe ciało, na maks.</i>	60 s	Drżenie, napięcie, „nie kontroluję”	„stracę kontrolę”

02 Protokół pojedynczego ćwiczenia

1 PRZEWIDYWANIE Zapisz: „Boję się, że...” + prawdopodobieństwo 0–100%.	2 WYKONANIE Wykonaj <i>całe</i> ćwiczenie do końca czasu. Nie skracaj.	3 POZOSTANIE Po ćwiczeniu zostań z odczuciem 30–60 s. <i>Nie oddychaj, nie pij.</i>	4 SPRAWDZENIE Czy to, czego się bałem/-am, się stało? Zwykle nie.	5 POWTÓRZ Tę samą sesję 3–5× w tygodniu, aż SUDS spadnie <30/100.
--	--	---	--	---

03 Czego NIE robić podczas ekspozycji

Bez głębokich oddechów uspokajających — to blokuje naruszenie oczekiwania.

Bez telefonu/osoby „na wszelki wypadek” — to zachowanie zabezpieczające.

Bez sprawdzania pulsu ani innych objawów cielesnych.

Bez dystrakcji — nie patrz w okno, nie myśl o czym innym. Bądź z odczuciem.

04 Dziennik sesji — 10 powtórzeń

#	ĆWICZENIE	PRZEWIDYWANIE „boję się że...”	% WIARY <i>przed</i>	SUDS <i>max</i>	% WIARY <i>po</i>	CO SIĘ STAŁO NAPRAWDĘ?
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Klucz: Craske i wsp. (2014) zaktualizowali teorię ekspozycji: efekt *nie* polega na redukcji lęku w trakcie ćwiczenia, ale na **naruszeniu oczekiwania** („myślałem/-am, że to będzie katastrofa — nie było”). Liczba powtórzeń ważniejsza niż czas trwania pojedynczej sesji. Najlepiej w różnych miejscach (dom, gabinet, park) — bo to wzmacnia generalizację.