

Testowanie *katastroficznych przewidywań*

Zapisz prognozę PRZED sytuacją, sprawdź wynik PO. Dane rozbrajają lęk mocniej niż argumenty.

CZAS: 10 min na zapis Każda sesja + zadanie domowe

ŹRÓDŁO: Clark (1986, 1997); Bennett-Levy i wsp. (2004)

JAK UŻYWAĆ

Przed każdą sytuacją wyzwalającą lęk zapisz **konkretną prognozę** + pewność (0-100%). Po sytuacji — co naprawdę się stało + nowa pewność. Klucz: prognoza musi być *sprawdzalna* — nie „będzie źle”, lecz „zemdleję w ciągu 5 minut w sklepie”. Po 3-5 eksperymentach przejrzyj wnioski.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Clark (1997) pokazał, że pacjenci z zaburzeniem panicznym **przeszacowują prawdopodobieństwo katastrofy 10-100 razy** względem rzeczywistego. Subiektywne „80% pewności, że zemdleję” wobec obiektywnego 0%. Werbalna debata żyje w innym systemie niż emocjonalna pewność. Empiryczne falsyfikowanie prognozy zmienia wagę przekonania: „*tak się bałem/-am, a nic się nie stało*” jest silniejsze niż „*statystycznie nic ci nie grozi*”.

01 Co znaczy „sprawdzalna prognoza”

Bezużyteczna prognoza to taka, której nie da się obalić. „Będzie źle” zawsze się „spełni” — zawsze coś jest nieprzyjemne. Sprawdzalna prognoza ma **cztery elementy**: konkretne odczucie, liczbę, horyzont czasowy, miejsce.

✗ BEZUŻYTECZNA

„Będzie źle”
„Coś się stanie”
„Nie wytrzymam”
„Będę miał/-a panikę”
— niemierzalne, zawsze „prawdziwe”

✓ SPRAWDZALNA

„Zemdleję w ciągu 5 min w sklepie”
„Dostanę atak o sile ≥ 80 SUDS w pierwszych 10 min”
„Serce zatrzyma mi się w windzie”
— konkret + liczba + czas + miejsce

02 Trzy przykłady — prognoza ↔ wynik

SYTUACJA	PROGNOZA (% WIARY)	CO SIĘ STAŁO NAPRAWDĘ	WIARA PO
Centrum handlowe <i>sobota, godz. 14</i>	„Dostanę atak i zemdleję publicznie” 80%	„Czułem/-am lęk przez 20 min, potem minął. Nikt nie zauważył.”	20%
Spotkanie w pracy <i>prezentacja zespołu</i>	„Serce stanie mi i umrę” 70%	„Kołatanie trwało 5 min, żyję. Skończyłem/-am prezentację.”	10%
Jazda windą <i>10 pięter</i>	„Zabraknie powietrza, uduszę się” 60%	„Dojechałem/-am, oddychałem/-am normalnie. Lęk umiarkowany, minął.”	5%

Wzór, który widzisz: wiara w katastrofę spada za każdym razem o 30-55 punktów. Po kilku eksperymentach mózg zaczyna kalibrować się *obiektywnie*, nie subiektywnie.

03 Dziennik eksperymentów — 6 pomiarów

Wybierz 6 najbliższych sytuacji wyzwalających. Wypełnij PRZED i PO każdej.

#	DATA + SYTUACJA	PROGNOZA „co DOKŁADNIE się stanie?”	WIARA PRZED (%)	WYNIK „co stało się NAPRAWDĘ?”	WIARA PO (%)	WNIOSEK dlaczego rozbieżność?
1						
2						
3						
4						
5						
6						

04 Wniosek po 6 eksperymentach

Po wypełnieniu wszystkich 6 wierszy odpowiedz na 2 pytania. Unikaj „bo miałem/-am szczęście” — szukaj wyjaśnienia strukturalnego (np. „*bo organizm sam reguluje lęk po 20 min*”).

ILE PROGNOZ SIĘ SPEŁNIŁO?

— policz, sprawdź na tabeli

DLACZEGO SIĘ NIE SPEŁNIŁY?

— wyjaśnienie strukturalne

Klucz: dane są silniejsze niż argumenty. Jeden sprawdzony eksperyment wart jest stu rozmów o tym, że „nic Ci nie grozi”. Bennett-Levy i wsp. (2004): eksperyment behawioralny (ang. *behavioral experiment*) to jedna z najpotężniejszych technik CBT — bo zmienia przekonanie poprzez doświadczenie, nie perswazję. Unikaj dyskusowania z lękiem — mierz go.