

Uwaga na ciele *vs* odwrócenie uwagi

Eksperyment ABA: 3 dni monitorowania ciała vs 3 dni odwracania uwagi. Im mniej monitorujesz, tym mniej objawów.

CZAS: 1 tydzień protokołu Codzienne zapisy **ŹRÓDŁO:** Clark (1997); Ehlers & Breuer (1996); Ehlers (1995)

JAK UŻYWAĆ

Przez tydzień przeplataj dni: **A** (poniedziałek, środa, piątek) — *celowo monitoruj* ciało 4x dziennie (skanuj objawy, sprawdzaj puls, zapisuj). **B** (wtorek, czwartek, sobota) — *celowo NIE monitoruj* (gdy myśl się pojawi, przenieś uwagę na zewnątrz). Niedziela — analiza. Cel: zobaczyć własne dane, że monitorowanie jest częścią problemu, nie rozwiązaniem.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Clark (1997) sklasyfikował nadmierne monitorowanie ciała jako *zachowanie zabezpieczające* utrzymujące panikę. Ehlers (1995): pacjenci z zaburzeniem panicznym lepiej wykrywają własne bicie serca niż osoby zdrowe — ta „umiejętność” podtrzymuje lęk. **Selektywna uwaga** (ang. *selective attention*) wzmacnia detekcję słabych sygnałów: im mocniej szukasz objawów, tym więcej znajdujesz i tym łatwiej je katastrofizujesz. Ehlers i Breuer (1996) eksperymentalnie pokazali, że trening odwracania uwagi *redukuje* częstość ataków.

01 🔔 Krótka demonstracja — zrób TERAZ przed czytaniem dalej

KROK A · 60 SEKUND SŁUCHANIA


Usiądź wygodnie. Przez całą minutę skupiaj uwagę na biciu serca. Próbuj policzyć uderzenia. Zauważ napięcie, rytm, intensywność.
Co czujesz? Jak silne jest bicie?

KROK B · 60 SEKUND O CZYM INNYM

Przez minutę wyobrażaj sobie swoje wakacje, ulubiony film, lub przejdź wzrokiem po pokoju, nazywając kolory rzeczy w myśli.
Po minucie — wróć do serca. Jak teraz?

Wniosek: serce biło tak samo przez całe 2 minuty. Zmieniła się *uwaga*, nie ciało. Tu jest dowód, że objawy „istnieją” głównie wtedy, kiedy na nie patrzysz.

02 🌀 Mechanizm — dlaczego monitorowanie nasila objawy



Metafora: jak **alarm, który nie wyłącza się**, bo ciągle sprawdzasz, czy działa. Każde sprawdzenie potwierdza, że alarm istnieje — i alarm zaczyna piszczeć głośniejsze.

03 Tydzień eksperymentu — naprzemienne dni A i B

Dni A (Pn, Śr, Pt): monitoruj normalnie — skanuj objawy, sprawdzaj puls, zapisuj liczby. **Dni B** (Wt, Czw, Sb): zakaz monitorowania. Gdy impuls sprawdzenia — kotwice sensoryczne (5 rzeczy, które widzę; 4, które słyszę; 3, których dotykam). **Nd**: porównanie.

DZ.	TRYB	ILE RAZY SPRAWDZAŁEM/-AM CIAŁO	ILE OBJAWÓW ZAUWAŻYŁEM/-AM	ŚREDNI LĘK 0–10	UWAGI
Pn	A				
Wt	B				
Śr	A				
Cz	B				
Pt	A				
Sb	B				

04 Niedziela — analiza tygodnia

ŚREDNIA Z DNI A (MONITORING)

— $Pn + Śr + Pt$ podzielone przez 3

WIARA „MONITOROWANIE MNIE CHRONI”

— przed eksperymentem (0–100%)

ŚREDNIA Z DNI B (ODWRACANIE)

— $Wt + Cz + Sb$ podzielone przez 3

WIARA TERAZ

— po tygodniu danych (0–100%)

WNIOSEK TRANSYTUACYJNY

— co teraz wiem o roli monitorowania w moim lęku?

Klucz: typowy wynik to 2–3× więcej objawów w dniach A niż w B. Odwrócenie uwagi **nie** jest unikaniem — celem nie jest „udawanie, że ciała nie ma”, ale pokazanie, że objawy *istnieją głównie wtedy, kiedy na nie patrzysz*. Po eksperymencie nie utrzymuj odwracania uwagi jako nowego zachowania zabezpieczającego — przejdź do ekspozycji interoceptywnej, gdzie nadal masz pełny kontakt z odczuciami, tylko bez katastrofizacji.