

Ekspozycja *wyobrażeniowa*

Gdy bodziec realny jest niedostępny: lot, burza, dentysta z 2-miesięczną kolejką. Pięć zmysłów, pierwsza osoba, czas teraźniejszy.

CZAS SESJI: 30–45 min **SKUTECZNOŚĆ:** niższa niż *in vivo*, ale znacząca

ŹRÓDŁO: Foa & Kozak (1986); Wolitzky-Taylor i wsp. (2008)

JAK UŻYWAĆ

Ekspozycja wyobrażeniowa (ang. *imaginal exposure*) — szczegółowa, wielozmysłowa wizualizacja sytuacji fobii w wyobraźni, prowadzona przez terapeutę lub nagranie, trwająca 30–45 minut. Mówisz w *pierwszej osobie*, w czasie *teraźniejszym* — nie „byłem w samolocie”, ale „wchodzę do samolotu, czuję zapach paliwa, słyszę szum”.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Foa i Kozak (1986, *emotional processing theory*): wyobraźnia aktywuje tę samą *sieć strachu* w mózgu, co bodziec realny — choć z mniejszą intensywnością. Pozwala to na *uczenie hamujące* (ang. *inhibitory learning*) wtedy, gdy ekspozycja *in vivo* jest niemożliwa lub niedostępna. Wolitzky-Taylor i wsp. (2008): skuteczność *imaginal* jest niższa niż *in vivo* ($d=0,36$ vs $0,61$), ale wyraźnie wyższa niż brak leczenia. Najlepsze zastosowania: **bodziec niedostępny** (lot, burza, dentysta), **przygotowanie przed *in vivo*** (gdy lęk na samą myśl jest powyżej 90/100), **PTSD** (zespół stresu pourazowego, gdzie powrót do realnej sytuacji jest niewskazany).

01 🕒 Kiedy stosować — wskazania i ograniczenia

✓ WSKAZANIA

Bodziec niedostępny: lot · burza · dentysta · szczepienie. **Lęk powyżej 90/100** na samą myśl — wyobrażeniowa jako krok do *in vivo*. **PTSD** — trauma niedostępna realnie. **Wstępna sesja** przed pierwszą realną ekspozycją.

✗ NIE WYSTARCZY SAMA

Gdy *in vivo* jest dostępna — wyobrażeniowa *zamiast* *in vivo* daje słabszy efekt. **Pacjent słabo wizualizuje** — rozważ rzeczywistość wirtualną (VR). **Bierne wyobrażanie** — bez wielozmysłowości i emocji efekt jest minimalny.

02 🗨️ Pięć zmysłów — klucz do żywej wizualizacji

Bierna wyobraźnia („widzę pająka”) nie aktywuje sieci strachu. Wielozmysłowa, intensywna — tak.

👁️ WZROK

Co widzę? Kolory, kształty, ruch. „Pająk jest czarny, ma długie nogi, porusza się powoli.”

👂 SŁUCH

Co słyszę? Dźwięki tła, oddech, ciszę. „Cichy szum, własny oddech, tykanie zegara.”

👋 DOTYK

Co czuję w ciele? Temperatura, faktura, napięcie. „Chłodny stół pod dłońmi, gorąca twarz, drżące kolana.”

👃 ZAPACH & SMAK

Co czuję nosem? „Zapach gabinetu, kurz, lekko stęchłe powietrze.” Często pomijany — bardzo silny.

💬 EMOCJE

Co czuję wewnątrz? „Lęk, ucisk w klatce, chęć ucieczki, ale też ciekawość.”

🧠 MYŚLI

Co przychodzi mi do głowy? „Nie dam rady, ugryzie mnie, muszę uciec.” Mów na głos.

03 Mój scenariusz — napisz to, co później będziesz odgrywał/-a

Wszystko w **pierwszej osobie**, w **czasie teraźniejszym**. Zaczynj od neutralnego początku, prowadź narrację przez bodziec lęku, dodaj *czego najbardziej się boisz*, że się stanie. Można nagrać i odsłuchiwać — codziennie 30 minut.

SYTUACJA — OPIS OGÓLNY

SCENARIUSZ — CO WIDZĘ, SŁYSZĘ, CZUJĘ KROK PO KROKU

NAJGORSZY MOMENT — CZEGO NAJBARDZIEJ SIĘ BOJĘ, ŻE SIĘ STANIE

04 Protokół sesji wyobrazeniowej

ETAP	CO ROBISZ	CZAS	CO ZAPISAĆ
1 · <i>Bezpieczne miejsce</i>	3 głębokie oddechy, krótka wizualizacja spokojnego miejsca.	2–3 min	
2 · <i>Wejście w scenariusz</i>	Czytasz/słuchasz scenariusza, w pierwszej osobie, w czasie teraźniejszym.	5–10 min	SUDS startowy: ____
3 · <i>Pogłębianie</i>	Wracasz do scenariusza wielokrotnie. Dodajesz nowe szczegóły zmysłowe.	15–25 min	SUDS co 5 min: ____
4 · <i>Powrót</i>	Powolne otwarcie oczu, krótka rozmowa, podsumowanie.	5 min	SUDS końcowy: ____

Klucz: Wyobrażeniowa to *most* do in vivo, nie zamiennik. Foa i wsp. (Prolonged Exposure dla PTSD): regularne odsłuchiwanie nagrania scenariusza między sesjami zwiększa skuteczność 2-krotnie. Jeśli na samą myśl o realnej ekspozycji SUDS przekracza 90, zacznij od 2–3 sesji wyobrażeniowych — potem przechodź do in vivo.