

Ekspozycja *in vivo*

Konfrontacja z realnym bodźcem — nie zdjęciem, nie wyobraźnią. Najskuteczniejsza forma terapii fobii.

CZAS SESJI: 60–90 min 3–5 sesji w tygodniu **ŹRÓDŁO:** Wolitzky-Taylor i wsp. (2008); Foa & Kozak (1986)

JAK UŻYWAĆ

Wejdź w sytuację z hierarchii (zaczynaj od SUDS 30–40). **Zostań** w niej — nie uciekaj, nie odwracaj uwagi telefonem, nie pij. Monitoruj SUDS co 5 min.

Sesja minimum 30–45 min, idealnie 60–90 min — krótsza może wręcz wzmocnić lęk. Powtórz tę samą sytuację 3–5× w ciągu tygodnia, w *różnych kontekstach*.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Wolitzky-Taylor i wsp. (2008, meta-analiza): ekspozycja *in vivo* skuteczniejsza niż wyobrażeniowa ($d=1,05$ vs $0,61$) i każda inna forma terapii fobii. Choy i wsp. (2007): NNT=3 — co trzeci leczony osiąga pełną remisję.

Mechanizm: mózg uczy się *nowego skojarzenia* „bodziec → bezpieczeństwo”, które zaczyna wygrywać ze starym „bodziec → zagrożenie”. Realny bodziec aktywuje wszystkie zmysły (obraz, dźwięk, dotyk) — uczenie jest znacznie głębsze niż przy zdjęciu czy wyobraźni.

PRZED Zaznacz teraz, zanim wejdiesz w sytuację ekspozycji.

SUDS
teraz

spokój 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

paniczny
lęk

01 Przygotowanie sesji

POZYCJA Z HIERARCHII

— co konkretnie

CZEGO OCZEKUJĘ?

— „najgorsze, co może się stać”

02 ✗ Zachowania zabezpieczające — do eliminacji

Zachowania zabezpieczające (ang. *safety behaviors*) — drobne strategię, które dają złudne poczucie kontroli, ale **blokuja uczenie się**. Mózg myśli: „przeżyłem TYLKO dlatego, że to robiłem”. Wypisz swoje i postanów je odłożyć.


TYPOWE PRZYKŁADY

osoba towarzysząca · leki przy sobie · alkohol „dla odwagi” · ciągłe sprawdzanie wyjścia · zaciskanie pięści

MOJE ZACHOWANIA ZABEZP.

CO ODŁOŻĘ TYM RAZEM

03 💡 Jak wygląda lęk w czasie ekspozycji



Lęk ROŚNIE, PLATEAU, potem SPADA — sam, bez ucieczki. Nie musisz go niczym „obniżyć”. To, co robisz, to po prostu zostawiasz. Każde przeczekanie plateau uczy mózg, że bodziec ≠ zagrożenie.

04 → Krok po kroku — przebieg sesji

1 · WEJŚCIE

Wybierz pozycję z hierarchii (SUDS 30–40 na start). Wejdź w sytuację. Zapisz SUDS startowe.

2 · ZOSTAŃ

BEZ ucieczki, BEZ telefonu, BEZ rozproszenia. Mózg uczy się tylko wtedy, gdy *jest* z bodźcem.

3 · MONITORUJ

Co 5 min sprawdzaj SUDS. Zauważ: rośnie, plateau, spadnie. To samo robi mózg.

4 · WYJŚCIE

Kończysz, gdy SUDS spadnie o połowę LUB minęło 45–60 min. „Sprawdziłem/-am, katastrofa nie nastąpiła.”

05 🕒 Tabela pomiarów SUDS — w trakcie sesji

MINUTA	SUDS 0–100	CO ZAUWAŻYŁEM/-AM <i>myśli, ciało, impulsy</i>
0 (start)		
5		
10		
20		
30		
45		
60		

Klucz: Ekspozycja działa nie dlatego, że lęk znika, ale dlatego, że uczysz się: „*mogę BYĆ w lęku i PRZETRWAĆ*”. NNT=3 (Choy i wsp., 2007) — to jedna z najsilniej udokumentowanych interwencji w psychoterapii.

PO Zaznacz na koniec sesji. Różnica = miara skuteczności dla Ciebie.

SUDS po *spokój* (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

*paniczny
lęk*