

Fobia latania (*awiofobia*)

Mieszanka kilku lęków — klaustrofobii, lęku wysokości, lęku przed utratą kontroli. Fakty, hierarchia, dźwięki samolotu.

CZAS PRACY: 15 min **WYSTĘPOWANIE:** 2,5–6,5% populacji

ŹRÓDŁO: Oakes & Bor (2010); Van Gerwen i wsp. (1997)

JAK UŻYWAĆ

Fobia latania (*awiofobia*) rzadko jest „czystym” lękiem. Najczęściej to **mieszanka kilku lęków**: klaustrofobii (ciasna kabina), lęku wysokości, lęku przed utratą kontroli, lęku przed wypadkiem. Leczenie wymaga podejścia wieloskładnikowego: psychoedukacja o mechanice lotu, hierarchia ekspozycji, czasem ekspozycja w rzeczywistości wirtualnej (VR) przed pierwszym realnym lotem.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Fakty są jednoznaczne: ryzyko śmierci w wypadku lotniczym wynosi około 1 na 11 milionów (analiza Harvard, 2006), w samochodzie — 1 na 5 000. Latanie jest około 2 200 razy bezpieczniejsze niż jazda samochodem. Mimo to *uczucie* niebezpieczeństwa pozostaje — bo ewolucyjnie mózg nie zna ptaka z metalu, nie ufa wysokości i nie lubi braku kontroli. Wiedza statystyczna sama z siebie fobii nie leczy — ale jest pierwszym krokiem hierarchii ekspozycji. Najskuteczniejsze leczenie łączy ekspozycję (w tym docelowo realny lot), CBT i, opcjonalnie, krótkie programy specjalistyczne (BA *Flying with Confidence*, w Polsce m.in. Skyway Bydgoszcz).

01 ☉ Z czego składa się Twój lęk — rozbierz na elementy

Zaznacz, które elementy działają w Twoim przypadku. Im więcej składowych, tym ważniejsze wieloskładnikowe leczenie.

☐ **Klaustrofobia** — ciasna kabina, nie można wyjść, długie godziny w jednym miejscu.

☐ **Lęk wysokości** (akrofobia) — bycie kilometry nad ziemią, świadomość pustki pod nogami.

☐ **Brak kontroli** — nie ja prowadzę, nie mogę nic zmienić, jestem zdany/-a na innych.

☐ **Lęk wypadku** — turbulencje, dźwięki silnika, „coś się dzieje, czego nie rozumiem”.

☐ **Lęk paniki** — co jeśli będę miał/-a atak paniki, a nie mogę wyjść?

☐ **Lęk społeczny** — co jeśli ktoś zauważy mój strach? Co pomyślą obok siedzący?

02 💡 Co tak naprawdę dzieje się w samolocie — dźwięki i ruchy

Każdy dźwięk i każda zmiana toru lotu ma konkretne wyjaśnienie. Mózg, który zna nazwę, panikuje rzadziej.

CO SŁYSZYSZ / CZUJESZ

CO TO OZNACZA

<i>Wibracje przy starcie</i>	Pełna moc silników, opór koła na pasie. Normalne, planowane, monitorowane przez pilotów.
<i>Dudnienie pod podłogą</i>	Chowanie podwozia kilka minut po starcie. Także otwieranie i zamykanie klap.
<i>Zmiana dźwięku silnika</i>	Redukcja mocy po osiągnięciu wysokości przelotowej. Samolot nie spada — tylko zwalnia silnik.
<i>Turbulencje</i>	„Dziury w drodze” — nierówności w powietrzu. Samolot jest zaprojektowany na obciążenia 3× silniejsze niż wszystko, co można spotkać.
<i>Pochylenie skrzydła</i>	Skręt — jak rower w zakręcie. Im ostrzejszy zakręt, tym większe pochylenie. Pełna kontrola pilotów.

03 Hierarchia ekspozycji — od najlżejszego do realnego lotu

Stopniowa droga w stronę pierwszego lotu. SUDS — subiektywna skala lęku 0–100 (ang. *Subjective Units of Distress Scale*). Wpisz swoje wartości, planuj sesje w realnym czasie.

KROK	EKSPOZYCJA	SUDS ORIENT.	MÓJ SUDS	DATA
1	Zdjęcia samolotów, kabin, startów — 10 min	20		
2	Filmy z lotów — widok z kokpitu i z okna	35		
3	Wizyta na lotnisku — obserwacja startów i lądowań	45		
4	Symulator lotu lub ekspozycja w VR — 30 min	55		
5	Krótki lot (do 1 godziny), w dzień, dobre warunki	75		
6	Dłuższy lot (2–4 godziny), niezależnie od pogody	65		
7	Lot długodystansowy, samodzielnie, bez sygnałów bezpieczeństwa	55		

04 Czego unikać podczas leczenia fobii latania

ALKOHOL PRZED LOTEM

Wycisza objawy, ale nie uczy mózgu, że samolot jest bezpieczny. Po wytrzeźwieniu lęk wraca silniejszy.

BENZODIAZEPINY RUTYNOWO

Craske i wsp. (2014): regularnie brane przed lotem *wzmacniają* fobię — mózg uczy się, że bez leku nie da rady. Ostateczność, nie strategia.

UNIKANIE OKNA I KABINY

Siedzenie w wybranym miejscu „bezpiecznym” — sygnał bezpieczeństwa. Mózg uczy się: „jestem bezpieczny *dzięki temu miejscu*”.

MONITOROWANIE PILOTÓW I ZAŁOGI

Hiperczułość na zachowanie obsługi — w istocie sygnał bezpieczeństwa. Zamiast tego: zwykłe zajęcia (film, książka, rozmowa).

Klucz: Każdy lot, który przeżyjesz (a przeżyjesz każdy), staje się dowodem przeciw katastroficznym przewidywaniom. Najszybsza droga przez fobię latania: krótki lot na pierwsze spotkanie z bodźcem, potem dłuższe loty — bez alkoholu, bez tabletek, ze świadomym monitorowaniem dźwięków. Skyway (Bydgoszcz), VRET Lab (Wrocław) — polskie ośrodki z doświadczeniem.