

Behawioralny test *zbliżania* (BAT)

Konkretne kroki dystansu i intensywności. Pomiar w metrach i sekundach — nie tylko w SUDS. Diagnostyka i terapia w jednym.

CZAS: 20–30 min na sesję **POMIAR:** dystans, czas kontaktu, SUDS

ŹRÓDŁO: Lang & Lazovik (1963); Öst (1989)

JAK UŻYWAĆ

BAT (ang. *Behavioral Approach Test*) to test zbliżania się do obiektu fobii krok po kroku. Każdy krok jest mini-eksperymentem behawioralnym: zbliżasz się, mierzysz *dystans* (w metrach), *czas kontaktu* (w sekundach) i *subiektywny lęk* (SUDS 0–100). Powtarzasz na każdej sesji — widzisz konkretny postęp.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Lang i Lazovik (1963): obiektywny pomiar behawioralny jest dokładniejszy niż samoocena lęku. Pacjent może mówić „już mi to nie przeszkadza”, ale nie zbliżyć się bliżej niż 3 m — **liczby pokazują prawdę**. Öst (1989) wbudował BAT jako standardowe narzędzie w protokole jednej sesji: jednocześnie ocena (kogo kwalifikujemy), terapia (każdy krok to ekspozycja) i wskaźnik postępu (sesja po sesji). Konkretność zwiększa motywację — widzisz cyfry, nie tylko „czuję się trochę lepiej”.

01 Trzy wymiary pomiaru — co zapisujesz przy każdym kroku

DYSTANS

W metrach lub centymetrach. „3 m od klatki”, „dłoń 10 cm od pająka”. Najbardziej widoczna miara postępu.

CZAS KONTAKTU

W sekundach lub minutach. „Patrzyłem/-am 30 s”, „dotykałem/-am 2 min”. Ile wytrzymałem/-am.

SUDS

Subiektywna skala lęku 0–100 (ang. *Subjective Units of Distress Scale*). Podczas kontaktu, nie tylko po.

02 Przykład — arachnofobia, 10 kroków BAT

Konkretna hierarchia, której można użyć od razu. SUDS w nawiasach — orientacyjne, Twoje mogą być inne.

KROK	EKSPOZYCJA	SUDS ORIENT.	MÓJ SUDS
1	Zdjęcie pająka, 30 sekund patrzenia	15	
2	Film z pajakiem, 2 minuty	25	
3	Pająk w słoiku, 3 metry od Ciebie	35	
4	Słoik, 1 metr od Ciebie	45	
5	Słoik w Twojej ręce	55	
6	Otwarty słoik obok Ciebie	60	
7	Pająk na stole, nic między Wami	70	
8	Twoja ręka 10 cm od pająka	80	
9	Pająk na dłoni w rękawiczce	85	
10	Pająk na gołej dłoni	90	

03 Mój BAT — 10 kroków dopasowanych do Twojej fobii

Wypisz 10 stopni zbliżania. Zaczynij od czegoś, co budzi minimalny lęk (SUDS 10–20). Skończ na docelowym kontakcie. Krok powinien być wyraźnie trudniejszy od poprzedniego, ale wykonalny.

KROK	CO KONKRETNIE ROBIĘ	DYSTANS / CZAS	SUDS
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

04 Przy każdym kroku — cztery pytania

PRZED

Czego się spodziewam, że się stanie? *Konkretnie.*

W TRAKCIE

SUDS co 30–60 sekund. Nie wychodzę, póki nie spadnie o co najmniej 30%.

PO

Co rzeczywiście się stało? Jak długo wytrzymałem/-am? Najbliższy dystans?

WNIOSEK

Czego się nauczyłem/-am? Czy katastrofa nadeszła? Co teraz myślę o tym bodźcu?

Klucz: Mierz *obiektywnie* — cyfry, nie wrażenia. SUDS oszukuje (mózg pamięta wybiórczo), dystans i czas nie. Po 4–6 sesjach możesz porównać liczby z pierwszej i ostatniej — widać postęp nawet wtedy, gdy „czuje się tak samo trudno”. To często najsilniejsza motywacja, by kontynuować.