

Fobia krwi i zastrzyków *BII*

Jedyna fobia z dwufazową reakcją — wymaga napinania mięśni, nie relaksacji. Protokół Larsa-Görama Östa.

CZAS TRENINGU: 1 tydz. przed ekspozycją **PRAKTYKA:** 5x/dzień · 5x napięcie + zwolnienie

ŹRÓDŁO: Öst, Fellenius & Sterner (1991)

JAK UŻYWAĆ

Trening: napinaj duże grupy mięśniowe (uda, brzuch, przedramiona, ramiona) przez 10–15 s, aż poczujesz ciepło w twarzy. Rozluźnij na 20–30 s. Powtórz 5 razy. **5 razy dziennie przez tydzień** — żeby umiejętność była automatyczna. **Podczas ekspozycji** (zdjęcia krwi → filmy → pobieranie krwi): na pierwsze sygnały spadku ciśnienia (zawroty, bladość, mroczyki) — natychmiast napnij mięśnie.

DLACZEGO TO DZIAŁA

BII (ang. *blood-injection-injury phobia*, fobia krwi-iniekcji-obrażeń) ma unikalną dwufazową reakcję wazowagalną: **krótki wzrost** tętna i ciśnienia, potem **nagły spadek** → omdlenie. Klasyczna relaksacja by to pogorszyła. Napinanie mięśni *podnosi* ciśnienie i blokuje omdlenie. Öst i wsp. (1991): 5 sesji napinania = 90% poprawa utrzymująca się rok. Page (1994): napinanie zapobiega 75% omdleń. Realne konsekwencje fobii BII: unikanie badań krwi, szczepień, dentysty, dawstwa krwi, ciąży — to zagrożenie zdrowia.


PRZED Mój poziom lęku przed widokiem krwi / igły — teraz, na starcie.

Lęk
bazowy

brak lęku (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

paniczny
lęk

01 Długość reakcja — dlaczego BII jest inna



W innych fobiach ciśnienie i tętno **rosną i utrzymują się** — układ współczulny (ang. *sympathetic*) dominuje. W BII organizm po początkowym wzroście **nagle przełącza się** na układ przywspółczulny (ang. *parasympathetic*) → spadek ciśnienia → omdlenie. Dlatego standardowa relaksacja paradoksalnie pogarsza.

02 Trening napinania mięśni — krok po kroku

CYKL JEDNORAZOWY

- 1 · Napnij *duże mięśnie naraz*: uda, pośladki, brzuch, przedramiona, ramiona.
- 2 · Trzymaj **10–15 s** — aż poczujesz ciepło na twarzy.
- 3 · Rozluźnij na **20–30 s**.
- 4 · Powtórz **5 razy**.

PLAN TYGODNIOWY

5x dziennie przez tydzień — zanim zaczniesz ekspozycję. Cel: umiejętność *automatyczna*, dostępna w stresie. Po tygodniu treningu mięśnie „pamiętają” sekwencję i włączają się szybko, gdy ciśnienie zacznie spadać.

03 Sygnały spadku ciśnienia — kiedy napinać podczas ekspozycji

Naucz się rozpoznawać **pierwsze sygnały**, że ciśnienie zaczyna spadać. Wtedy natychmiast napnij mięśnie — nie czekaj.

Bladość · twarz, dłonie

Zawroty · „kręci się”

Mroczyki · punkty, mgła

Pot zimny · czoło, kark

Nudności · żołądek

„Wyciszenie” · dźwięki cichną

04 Hierarchia ekspozycji BII — przykład

Typowa hierarchia w fobii krwi-zastrzyków. Wpisz swoje SUDS i datę realizacji. Pamiętaj o napinaniu mięśni od momentu pierwszych sygnałów spadku ciśnienia.

#	SYTUACJA	SUDS 0–100	NAPIĘCIE razy	DATA
1	Słowo „krew”, „strzykawka” — wymówione na głos			
2	Rysunek strzykawki / kropli krwi			
3	Zdjęcie zastrzyku w internecie			
4	Film o pobieraniu krwi (YouTube, 2–3 min)			
5	Trzymanie pustej strzykawki w ręce			
6	Obserwacja pobierania krwi w przychodni			
7	Samodzielne pobranie krwi (badanie morfologii)			

05 Pozycja awaryjna — gdy czujesz, że tracisz przytomność

CO ZROBIĆ

- 1 · Usiądź i pochyl głowę między kolana.
- 2 · Napnij wszystkie duże mięśnie naraz.
- 3 · Trzymaj 15 s, rozluźnij, powtórz.
- 4 · Po 2–3 cyklach ciśnienie wraca do normy.

SKUTECZNOŚĆ

Öst i wsp. (1991): pozycja głowa-między-kolana + napinanie zapobiega omdleniu w **~95% przypadków**. To *najlepsza ochrona* przed utratą przytomności w gabinecie lekarskim, dawstwie krwi i przy szczepieniach.

Klucz: Fobia BII to jedyna fobia, w której wróg to nie tylko lęk, ale i *ciśnienie krwi*. Standardowa relaksacja by ją pogłębiła. Napinanie mięśni odwraca dwufazową reakcję — **5 sesji = 90% poprawa rok później** (Öst i wsp., 1991).