

Eksperymenty *behawioralne*

Nie wystarczy zakwestionować przekonanie w głowie. Trzeba je sprawdzić w życiu. Eksperyment behawioralny to mały test rzeczywistości.

CZAS: 30 min planowanie + tydzień Po zapisie myśli i przekonaniach

ŹRÓDŁO: Bennett-Levy i wsp. (2004); Beck (2011)

JAK UŻYWAĆ

Eksperyment behawioralny to **zaplanowane działanie**, mające sprawdzić — w realnym życiu — czy *konkretne przekonanie* jest prawdziwe. W PPU testujemy najczęściej: „nie wytrzymam wieczoru bez porno”, „cały czas będę myślał o seksie”, „jak nie obejrzę, będę nieefektywny w pracy”, „partner/-ka zauważy, że jestem sfrustrowany/-a”. Karta uczy **5 kroków eksperymentu**: 1) hipoteza, 2) plan, 3) przewidywanie, 4) wykonanie, 5) wnioski.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Beck (2011) podkreśla: **doświadczenie zmienia przekonania silniej niż argumenty**. Pacjent może racjonalnie wiedzieć, że „wytrzymam wieczór bez porno” — ale dopóki tego *nie sprawdzi*, przekonanie „nie wytrzymam” pozostaje aktywne. Eksperymenty behawioralne to **najszybsze narzędzie** CBT (Bennett-Levy i wsp. 2004): jeden dobrze zaplanowany eksperyment daje więcej zmiany niż 5 sesji kwestionowania poznawczego. W PPU eksperymenty mają dodatkowe znaczenie: pacjent latami unika sytuacji „ryzykownych” (samotny wieczór, łóżko bez partnera), co utrzymuje moc wyzwalaczy. Eksperyment behawioralny pokazuje, że *da się być w tej sytuacji* bez sięgnięcia.

01 Pięć kroków eksperymentu

KROK	CO ROBIMY	PRZYKŁAD W PPU
1 · Hipoteza	Konkretne przekonanie do sprawdzenia. Krótkie zdanie, jasne, mierzalne.	„Nie wytrzymam wieczoru sam w domu bez sięgnięcia po porno”
2 · Plan	Dokładny scenariusz: gdzie, kiedy, jak długo, co zabieram, co zostawiam.	Piątek wieczór, dom, 19–23, książka, podcast, herbata. Telefon w drugim pokoju.
3 · Przewidywanie	Co spodziewam się, że się stanie? Zapisz przed eksperymentem.	„Wytrzymam do 21, potem sięgnę.” Pewność: 70%.
4 · Wykonanie	Po prostu wykonuję plan. Notuję, co czuję, co myślę, co się dzieje.	Notuję co godzinę: o 20 — głód 60/100, czytam dalej, o 22 — głód 30/100, czuję się ok.
5 · Wnioski	Co się rzeczywiście stało vs przewidywanie? Czego nauczyłem/-am się?	Wytrzymałem całe 4 h. Głód spadł sam. „Nie wytrzymam” było fałszywe. Mogę powtórzyć.

02 Najczęstsze eksperymenty w PPU

„Nie wytrzymam głodu” — eksperyment: pozostać z głodem 30 min bez reakcji, mierzyć SUDS co 5 min. Sprawdzić, czy mija sam.

„Tylko porno mnie zrelaksuje” — sprawdzić 3 inne aktywności (gorąca kąpiel, spacer, rozmowa) i porównać poziom relaksu po 30 min.

„Bez porno nie zasnę” — sprawdzić tydzień zasypiania bez. Notować czas zasypiania, jakość snu.

„Partner/-ka się domyśli, że jestem sfrustrowany/-a” — sprawdzić tydzień bez. Spytać partnera/-kę o nastrój. Porównać z przewidywaniem.

03

Twój eksperyment — zaplanuj jeden

1 · HIPOTEZA — PRZEKONANIE DO SPRAWDZENIA

— krótkie zdanie

2 · PLAN — DOKŁADNY SCENARIUSZ

— gdzie, kiedy, jak długo, co zabieram

3 · PRZEWIDYWANIE + PEWNOŚĆ (%)

— co spodziewam się, że się stanie

4 · CO SIĘ RZECZYWIŚCIE STAŁO — WYPEŁNIJ PO WYKONANIU

5 · WNIOSKI — CZEGO SIĘ NAUCZYŁEM/-AM

— co wiem teraz inaczej

04

Zasady udanego eksperymentu

Zacznij od łatwego — pierwszy eksperyment powinien mieć 70%+ szans powodzenia. Sukces buduje motywację.

Mierzalność — przewidywanie musi być sprawdzalne. „Wytrzymam 4 h” — tak. „Będę się czuł lepiej” — za mało konkretne.

Plan B — co zrobię, jeśli SUDS przekroczy 80? Wcześniej zaplanowane wyjście (telefon do osoby, spacer) jest częścią eksperymentu.

Nawet „porażka” jest danymi — jeśli sięgnąłeś/-aś — co to mówi? Może hipoteza była częściowo prawdziwa? Może plan był słaby? Dane.

Klucz: Bennett-Levy i wsp. (2004, podręcznik *Oxford Guide to Behavioural Experiments*) podkreślają, że **eksperymenty behawioralne** są najsilniejszą interwencją CBT — silniejszą niż czysta praca poznawcza. Mechanizm: *doświadczenie* aktywuje uczenie się na poziomie emocjonalno-cieleśnym, nie tylko poznawczym. „Wiem, że wytrzymam” (poznawcze) staje się „*poczułem, jak wytrzymuję*” (doświadczeniowe). Druga forma wiedzy jest trwała. W PPU sugerowana norma: **1-2 eksperymenty tygodniowo** przez pierwsze 8 tygodni terapii. Po tym czasie pacjent ma własną bazę dowodów przeciw głównym przekonaniom.