

Blokery i kontrola dostępu cyfrowego

Blokery nie wyleczą PPU. Ale dadzą Ci 30 sekund przerwy — i to wystarczy, by świadomy mózg się włączył. Praktyczny przewodnik po wyborze i konfiguracji.

CZAS: 30-60 min na konfigurację Po decyzji o pracy nad PPU

ŹRÓDŁO: Roberts (2010); literatura kliniczna; przegląd narzędzi 2024

JAK UŻYWAĆ

Karta przedstawia praktyczne podejście do **blokerów** — narzędzi technologicznych ograniczających dostęp do pornografii. Karta porządkuje: 1) **typy** blokerów (na poziomie systemu, przeglądarki, DNS, urządzenia), 2) **cztery zasady** skutecznej konfiguracji, 3) limity blokerów — czego nie potrafią, 4) rekomendowane narzędzia, 5) jak uniknąć „walki z blokerem”. *Uwaga:* blokery są **uzupełnieniem** terapii, nie zastępstwem.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Roberts (2010) i nowsze badania nad blokerami (Kraus i wsp. 2018) wykazują: **same blokery** dają 10-20% redukcji epizodów PPU. To *nie* jest wysoki wynik. **Blokery + terapia + sieć wsparcia** dają 60-70%. Mechanizm: bloker nie usuwa głodu, nie zmienia przekonań, nie zaspokaja potrzeb emocjonalnych. *Daje 30 sekund przerwy* — fizyczną barierę, którą trzeba świadomie obejść. W tych 30 sekundach pacjent ma szansę „opamiętać się”: kora przedczołowa się włącza, świadomy obserwator wchodzi do gry. Bez blokera — automat sięgnięcia kończy się epizodem w 3 sekundy. Z blokerem — 30 sekund opóźnienia często wystarcza, by zatrzymać.

01 = Cztery poziomy blokowania

1 · POZIOM DNS / ROUTER

Blokowanie na poziomie sieci — *wszystkie urządzenia* w sieci. Najsilniejsze.

Narzędzia: Pi-hole, NextDNS, AdGuard DNS, Cloudflare Family DNS (1.1.1.3)

Plus: bardzo trudne do obejścia

Minus: nie chroni poza domem (telefon w 5G)

2 · POZIOM SYSTEMU OPERACYJNEGO

Wbudowane kontrole rodzicielskie / czasu ekranu.

iOS: Screen Time → ograniczenia treści. Hasło u kogoś bliskiego.

Android: Digital Wellbeing, Family Link

Windows / macOS: Kontrola rodzicielska

Plus: wbudowane, darmowe

3 · POZIOM APLIKACJI BLOKUJĄCE

Dedykowane aplikacje na komputer + telefon.

Płatne: Covenant Eyes, Accountable2You, BlockerX

Darmowe: Cold Turkey (komputer), AppBlock (Android)

Plus: raporty, partner odpowiedzialności

Minus: można odinstalować

4 · POZIOM PRZEGLĄDARKI

Rozszerzenia / przeglądarki specjalistyczne.

Rozszerzenia: BlockSite, Site Blocker

Przeglądarki: Brave z filtrami, Bromite

Plus: proste, szybkie

Minus: najłatwiej obejść (przełączysz przeglądarkę)

02 ● Cztery zasady skutecznej konfiguracji

1 · Hasło u kogoś bliskiego. Bloker, którego sam możesz wyłączyć w 30 sekund, jest *bezużyteczny*. Hasło u partnera/-ki, przyjaciela, terapeuty.

2 · Wielopoziomowość. Jeden poziom = łatwo obejść. *Trzy poziomy* (DNS + system + aplikacja) = praktycznie nie do obejścia.

3 · Wszystkie urządzenia. Bloker na komputerze, ale telefon „do swobodnego użytku” → bezsensowny. Wszędzie albo nigdzie.

4 · Partner odpowiedzialności. Bloker z raportowaniem do drugiej osoby (Covenant Eyes) zwiększa skuteczność o 30-40% wg badań.

03 ✗ Czego blokery NIE zrobią

· Nie usuną **głodu** — głód pojawia się niezależnie

· Nie zmienią **przekonań** i wartości

· Nie zaspokoją **potrzeb** emocjonalnych

· Nie wyleczą **depresji** / **lęku** u podłoża

· Nie zatrzymają **twórczości** w obchodzeniu (VPN, tryb prywatny)

· Nie zastąpią **terapii** ani sieci wsparcia

Klucz: bloker to *jeden filar* w 6-filarowym planie profilaktyki nawrotów. Sam — daje 10–20%. W kombinacji z terapią, wartościami, regulacją emocji, siecią wsparcia — daje 60–70%. *Nie* oczekuj cudów od samego blokera.

04 ✎ Twój plan konfiguracji

POZIOMY, KTÓRE WDROŻĘ

— 1, 2, 3, 4 — *minimum 2*

KONKRETNE NARZĘDZIA

— *jakie aplikacje / ustawienia*

KTO TRZYMA MOJE HASŁA

— *osoba, którą mogę poprosić w razie potrzeby*

WSZYSTKIE URZĄDZENIA

— *komputer, telefon, tablet, telewizor*

Sygnal ostrzegawczy: jeśli zaczynasz *szukać sposobów obejścia blokera* (VPN, nowa przeglądarka, inny telefon) — to **warning sign**. Sygnalizuje, że głód jest silny i potrzebujesz dodatkowych interwencji, nie technologicznych: kontakt z terapeutą, sieć wsparcia, eskalacja planu kryzysowego. Walka z blokerem to objaw, nie problem techniczny.

Klucz: blokery działają na zasadzie **tarcia decyzyjnego** (Thaler & Sunstein, „*Nudge*”). Nie zatrzymują *determinacji* — zatrzymują *impuls*. W stanie chłodnym możesz świadomie obejść każdy bloker. W stanie impulsywnym 30 sekund bariery wystarczy, by chłodny mózg się włączył. Stąd skuteczność blokerów jest *najwyższa* u osób, które jeszcze nie chcą obchodzić — czyli na wczesnym etapie pracy. Z czasem, gdy budujesz inne strategie (regulacja emocji, wartości), znaczenie blokerów maleje. Po roku zdrowej pracy często można je zdjąć — bo świadomy mózg jest „włączony” domyślnie.