

Seks w parze po PPU

PPU zniekształca oczekiwania, partner/-ka czuje się zastąpiona/-y. Odbudowa intymności wymaga restartu — nie powrotu do „dawnego”, tylko zbudowania nowego.

CZAS: miesiące pracy Po 3+ mies. abstynencji od porno

ŹRÓDŁO: Hall (2012, „Understanding and Treating Sex Addiction”); Carnes (2001)

JAK UŻYWAĆ

Karta przedstawia **protokół odbudowy** seksualności w parze po PPU. Hall (2012) opisuje, że PPU zniekształca seksualność w 3 wymiarach: 1) *oczekiwania* (porno tworzy nierealne standardy), 2) *responsywność* (mózg „nauczony” odpowiadać na ekran, nie żywą osobę), 3) *intymność* (porno jest *łatwiejsze* emocjonalnie niż żywa partnerka). Karta przedstawia: 1) *fazy odbudowy*, 2) konkretne ćwiczenia, 3) typowe trudności, 4) co działa, co szkodzi.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Hall (2012) podkreśla, że **seks w parze po PPU** nie jest po prostu „powrotem do normalności”. Mózg pacjenta jest *przewrażliwiony* na bodźce wizualne, partnerka jest w *traumie zdrady*, oboje mają *nowe* doświadczenia do zintegrowania. Próba „*uprawiamy seks jak dawniej*” zwykle *pogarsza* sytuację. Konieczna jest **świadoma odbudowa** — krok po kroku, od bezpiecznego kontaktu fizycznego, przez czuły dotyk, do pełnego seksu. Carnes (2001) zaleca **okres celibatu** (60–90 dni) w parze jako reset — by zerwać z dotychczasowymi automatami i zbudować nową bazę. Nie wszystkie pary tego potrzebują — ale wiele pacjentów raportuje, że okres celibatu był punktem przełomowym.

01 = Trzy fazy odbudowy

FAZA 1 · RESET (MIES. 1–3)

Opcjonalny celibat w parze (60–90 dni). Lub minimum seksu — tylko za *jej* inicjatywą. Praca nad bezpieczeństwem emocjonalnym przed bliskością fizyczną.

Cel: zerwanie z automatami, zbudowanie zaufania.

FAZA 2 · CZUŁY DOTYK (MIES. 3–6)

Ćwiczenia *sensate focus* (Masters & Johnson) — dotyk bez celu seksualnego. Pierwsze tygodnie: tylko nieseksualne strefy. Potem stopniowo. Bez obowiązku orgazmu.

Cel: nauczanie mózgu odpowiadać na *kontakt*, nie na bodźce wizualne.

FAZA 3 · INTEGRACJA (MIES. 6+)

Powrót do pełnej intymności seksualnej, ale *nowej* — z większą uważnością, kontaktem oczami, komunikacją. Seks oparty na *obecności*, nie wykonaniu.

Cel: pełna intymność, głębsza niż przed PPU.

02 Typowe trudności + jak z nimi pracować

Trudności z erekcją z partnerką — mózg „*oduczony*” odpowiadać na żywą osobę. Powrót zdolności trwa 3–9 mies. abstynencji od porno. Cierpliwość, brak presji.

Flashbacki / porównania u partnerki — może mieć obrazy z wyobrazonego porno, gdy uprawia seks z Tobą. Wymaga jej terapii, Twojej cierpliwości.

Lęk przed odrzuceniem u Ciebie. Po latach „*łatwego*” seksu z porno, prawdziwa intymność jest nowa i przerażająca. Normalne. Terapia indywidualna.

Komentowanie ciała / żądania — jak w porno. *Nie*. Partnerka nie jest aktorką, jej ciało nie jest „*idealne*”. Akceptacja realności.

03 ● Co działa — zasady nowego seksu

1. Tylko za jej (lub obopólną) inicjatywą — przez pierwsze miesiące Ty *nie* proponujesz seksu.

3. Komunikacja w trakcie. „Co Ci sprawia przyjemność? Mogę zrobić inaczej?”

5. Powolność. Cały kontakt może trwać 1–2 h, z różnymi etapami, bez pośpiechu.

2. Kontakt oczu w trakcie. Bez „oddawania się fantazji”. Świadome bycie z drugą osobą.

4. Orgazm to *nie* cel. Cel — bycie razem. Orgazm może być, może nie być. Brak presji.

6. Akceptacja jej tempa. Jeśli nie jest gotowa — czekasz. Bez emocjonalnego szantażu.

04 ✎ Twoja praca z intymnością

FAZA, W KTÓREJ JESTEM

— 1 reset, 2 czuły dotyk, 3 integracja

MOJA NAJWIĘKSZA TRUDNOŚĆ

— co najczęściej mnie blokuje

CO MOGĘ ZROBIĆ, BY WZMOCNIĆ BEZPIECZEŃSTWO EMOCJONALNE PARTNERA/-KI

— konkretne małe zachowania

Klucz: Hall (2012) podkreśla, że **seks po PPU może stać się lepszy niż przed**, ale wymaga *fundamentalnej zmiany* — od seksu nastawionego na *wykonanie i bodźce wizualne*, do seksu nastawionego na *obecność i kontakt*. To nie jest mniej intensywne — jest *inaczej* intensywne. Wiele par raportuje po 2 latach pracy: „*nie wracamy do dawnego seksu, mamy nowy*”. Dawny był *łatwiejszy*, nowy jest *głębszy*. Ta zmiana jest możliwa, ale wymaga: 1) abstynencji od porno (co najmniej 6 mies.), 2) cierpliwości partnerki, 3) terapii indywidualnej obojga, 4) często terapii seksuologicznej pary.