

Analiza łańcuchowa

ABC pokazuje 3 elementy. Chain analysis pokazuje 7. Każda kostka domina, która prowadzi do epizodu. Im więcej widzisz, tym więcej punktów do przzerwania.

CZAS: 45 min na łańcuch Po znaczącym epizodzie

ŹRÓDŁO: Linehan (1993, 2015); DBT skills training manual


JAK UŻYWAĆ

Chain analysis (ang. *behavior chain analysis*) to **rozszerzona wersja** ABC, opracowana przez Marshę Linehan w ramach DBT. Rozbija epizod na **7 ogniw**: 1) podatność, 2) wyzwajające zdarzenie, 3) łańcuch ogniw pośrednich (myśli, emocje, działania), 4) zachowanie problemowe, 5) konsekwencje krótkoterminowe, 6) konsekwencje długoterminowe, 7) strategie zmiany na przyszłość. Cel: zobaczyć *każdą* kostkę domina i znaleźć *najlepszy* punkt, w którym da się przerwać sekwencję.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Linehan (1993) wprowadziła chain analysis jako narzędzie pracy z BPD i samouszkodzeniami — sytuacjami, gdzie zachowanie problemowe jest *szybkie* i pacjent „*nie pamięta*” decyzji. Idealnie pasuje do PPU, które ma podobną dynamikę: szybki impuls, niewielka świadomość decyzji. Chain analysis pokazuje, że to *nie jeden impuls* — to **łańcuch 7-15 mikrodecyzji**. Każda jest pojedynczą możliwością przzerwania. Badania w DBT (Linehan i wsp. 2006) pokazują: pacjenci wykonujący 1 chain analysis tygodniowo redukują częstość zachowań problemowych o **40-60%** w 6 miesiącach — bo nauczają się *widzieć* łańcuch, a nie tylko jego efekt.

01 = Siedem ogniw łańcucha



Każde ogniwo można *zauważyć, opóźnić, przerwać*. Im wcześniejsze ogniwo (1-3) — tym łatwiej. Im później (4-6) — tym trudniej. Cel: **nauczyć się widzieć łańcuch w trakcie**, nie dopiero po fakcie.

02 ☉ Każde ogniwo — co znaczy

OGNIWO	CO TO ZNACZY	STRATEGIA INTERWENCJI
1 · Podatność	Stan fizyczny / emocjonalny, który zwiększa ryzyko — niewyspanie, głód, samotność, stres	Higiena snu, regularne posiłki, sieć wsparcia
2 · Wyzwalacz	Konkretne zdarzenie zewnętrzne — telefon w rękę, samotny wieczór, kłótnia, reklama	Hands-off, kontrola środowiska, plan „jeśli-to”
3 · Myśli pośrednie	„Tylko sprawdzę”, „i tak nikogo nie ma”, „zasługuję sobie”	Defuzja (ACT), kwestionowanie poznawcze (CBT)
3b · Emocje pośrednie	Pobudzenie, lęk, „tunelowanie” świadomości, niecierpliwość	TIP (DBT), oddech, ruch fizyczny, kontakt z osobą
4 · Zachowanie	Sam akt — otwarcie strony, sesja, kulminacja	Mało już da się zrobić; cel: skrócić sesję
5+6 · Konsekwencje	Krótkie (ulga) i długie (wstyd, koszty)	Autosympatia (nie biczowanie), analiza dla nauki

03 Twój łańcuch — krok po kroku

Wybierz ostatni znaczący epizod. Opisz każde ogniwo. Bądź szczegółowy/-a — to są Twoje dane do nauki.

1 · PODATNOŚĆ

— jak się czułem/-am tego dnia, sen, jedzenie, stres

2 · WYZWALACZ

— konkretne zdarzenie

3 · MYŚLI POŚREDNIE

— co dokładnie mówiłem/-am sobie w głowie

3B · EMOCJE POŚREDNIE

— jakie ciało, jakie uczucia

4 · ZACHOWANIE

— co dokładnie, ile czasu

5 · KONSEKWENCJE KRÓTKIE I DŁUGIE

— co po, co później

04 Punkt przzerwania — gdzie następnym razem

NAJLEPSZY PUNKT PRZERWANIA

— które ogniwo da najwięcej szans

KONKRETNA STRATEGIA

— co dokładnie zrobię w tym ogniwie

Klucz: Linehan (2015) w podręczniku DBT podkreśla, że **jakość analizy** jest ważniejsza od częstotliwości. Lepiej zrobić jedną dokładną analizę miesięcznie niż 10 powierzchownych. Cel: *nauczyć się obserwować łańcuch w trakcie*. Po 5–10 dokładnych analizach pacjent rozpoznaje swój łańcuch w czasie rzeczywistym — i może przerwać *zanim* dojdzie do ogniwa 4. To kompetencja metapoznawcza — uczy się latami. Pierwsze 10 analiz wydaje się żmudnych. Wartość przychodzi przy 20+.