

HALT — cztery stany podatności

Cztery podstawowe sygnały, w których ryzyko sięgnięcia jest najwyższe: *Hungry, Angry, Lonely, Tired*. Po polsku: *głód, złość, samotność, zmęczenie*. Szybki przegląd przed decyzją.

CZAS: 30 sekund check-in 3× dziennie + przed kryzysem

ŹRÓDŁO: tradycja AA (Twelve Steps, lata 30.); rozszerzenia kliniczne

JAK UŻYWAĆ

HALT to akronim z tradycji AA (Anonimowi Alkoholicy): **H**ungry, **A**ngry, **L**onely, **T**ired. Po polsku: *głód, złość, samotność, zmęczenie*. To **cztery najczęstsze stany podatności**, w których ryzyko impulsywnego sięgnięcia jest najwyższe. Karta uczy *szybkiego check-in*: w 30 sekund sprawdzasz, czy któryś z 4 stanów jest aktywny, i jeśli tak — adresujesz *najpierw* ten stan, dopiero potem podejmujesz decyzję.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Tradycja AA (lata 30. XX w.) zauważyła empirycznie, że **nawroty w uzależnieniach** zwykle następują w jednym z 4 stanów: głód, złość, samotność, zmęczenie. Te stany *obniżają samokontrolę* — fizjologicznie (kora przedczołowa wymaga glukozy, snu, regulacji emocji). W PPU mechanizm jest taki sam: pacjent z głodem fizycznym, gniewem, samotnością lub zmęczeniem ma **2-3× wyższe ryzyko** sięgnięcia po porno niż w stanie wyjściowym. HALT to *profilaktyczna interwencja*: zanim podejmiesz jakąkolwiek decyzję, sprawdź 4 stany. Jeśli aktywne — zaadresuj je pierwsze. Decyzja po HALT będzie znacznie lepsza.

01 = Cztery stany — co znaczą, co robić

H · GŁÓD (HUNGRY)

fizjologiczny, niski poziom glukozy

Mózg w głodzie ma niski glukozę → spadek kory przedczołowej → spadek samokontroli. Także *głód emocjonalny* (potrzeba bliskości, sensu).

Co robić: regularne posiłki co 3–4 h. Białko + tłuszcz, nie sam cukier (wzrosty i spadki). Picie wody.

A · ZŁOŚĆ (ANGRY)

aktywacja, frustracja, gniew

Gniew → wysokie pobudzenie autonomiczne → szukanie wyładowania. Porno daje pseudo-kontrolę w fantazji.

Co robić: ruch fizyczny (rozładowanie), pisanie (nie wysyłane), rozmowa z osobą bezpieczną, mediacja konfliktu.

L · SAMOTNOŚĆ (LONELY)

brak kontaktu, izolacja

Samotność → bólowy stan społeczny → szukanie substytutu intymności. Porno = bezpieczna „bliskość” bez ryzyka.

Co robić: kontakt — telefon, spotkanie, grupa wsparcia. Nawet krótki, „*jak się masz?*” — działa.

T · ZMĘCZENIE (TIRED)

niedosypianie, wyczerpanie

Zmęczenie → spadek kory przedczołowej, wzrost impulsywności. Najczęściej wieczorem — typowy moment PPU.

Co robić: sen 7–8 h, krótka drzemka (20 min), odpoczynek mentalny. Zmęczenie nie regulacja porno.

02 ● Protokół HALT — 30 sekund check-in

KIEDY STOSOWAĆ

- Codziennie 3× — rano, południe, wieczór
- Gdy pojawia się myśl o porno
- Przed jakąkolwiek decyzją w stanie pobudzenia
- Przed snem (zwłaszcza gdy samotnie)
- Po stresującej sytuacji

JAK STOSOWAĆ — 30 S

H: Czy jestem głodny/-a? (0/1)

A: Czy jestem zły/zła? (0/1)

L: Czy jestem samotny/-a? (0/1)

T: Czy jestem zmęczony/-a? (0/1)

Jeśli któryś 1 → zaadresuj *najpierw*, dopiero potem decyzja.

03 Twój wzorzec HALT — autoanaliza

Sprawdź wzorce z ostatnich 5 epizodów. Który ze stanów HALT najczęściej poprzedzał sięgnięcie?

STAN	CZĘSTOŚĆ W EPIZODACH (1–5)	MOJE SYGNAŁY / SYTUACJE
<i>H · Głód</i>		
<i>A · Złość</i>		
<i>L · Samotność</i>		
<i>T · Zmęczenie</i>		

04 Mój dominujący stan + plan

MÓJ DOMINUJĄCY STAN PODATNOŚCI

— H, A, L czy T

3 KONKRETNE KROKI, BY GO ZREDUKOWAĆ

— *codzienna higiena, nie tylko w kryzysie*

Praktyczna wskazówka: HALT jest najsilniejszą profilaktyką, gdy stosowana *regularnie*, nie tylko w kryzysie. Wbudowanie HALT w codzienne rutyny (np. przed obiadem, przed wyjściem z pracy, przed snem) sprawia, że stany podatności są *regulowane na bieżąco* — i kryzysów po prostu jest mniej. To *profilaktyka pierwszego stopnia*, nie kryzysowe ratownictwo.

Klucz: tradycja AA odkryła HALT empirycznie w latach 30. — bez badań naukowych, na podstawie obserwacji tysięcy nawrotów. Współczesna nauka potwierdza: każdy z 4 stanów *zmniejsza zasoby kory przedczołowej i zwiększa impulsywność*. Konkretnie: niski cukier we krwi (głód) obniża samokontrolę o 20–30% (Gailliot & Baumeister 2007); niedosypianie 1 noc — porównywalnie z poziomem alkoholu 0,5‰ (Dawson & Reid 1997); samotność aktywuje obszary mózgu związane z bólem fizycznym (Eisenberger 2003); gniew obniża aktywność kory orbitofrontalnej. *HALT to nie zabobon — to neurofizjologia w skrócie*. Codzienna praktyka to forma higieny mózgu.