

Sygnały ostrzegawcze

Terry Gorski wyróżnił 37 sygnałów ostrzegawczych, które poprzedzają nawrót — często tygodnie wcześniej. Karta przedstawia najważniejsze + Twój system codziennego monitorowania.

CZAS: 15 min codziennie Stały monitorowanie

ŹRÓDŁO: Gorski (1989, „*Staying Sober*”); współczesne adaptacje

JAK UŻYWAĆ

Terry Gorski (1989) — czołowy specjalista zapobiegania nawrotom — wyróżnił **37 sygnałów ostrzegawczych** przed nawrotem, pogrupowanych w kategorie: zmiany w myśleniu, w emocjach, w zachowaniach, w stylu życia. Karta przedstawia: 1) **5 głównych kategorii** sygnałów, 2) **10 najczęstszych** w PPU, 3) Twoja *codzienna checklista*, 4) co robić, gdy wykrywasz sygnały.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Gorski wykazał, że **nawrót zaczyna się tygodnie przed epizodem**. Pierwsze sygnały to *subtelne zmiany* — gorsze nastawienie, opuszczone sesje terapii, izolacja. Pacjent ich *nie* dostrzega lub bagatelizuje. Po tygodniach narastania — pojawia się epizod, który wydaje się „*nagłą katastrofą*”, ale w rzeczywistości jest **zwieńczeniem** procesu. **Codziennie monitorowanie** sygnałów (5 min wieczorem) umożliwia wczesne wykrywanie — wtedy interwencja jest łatwa. Gorski: pacjenci z codziennym monitorowaniem mają **50-70%** mniej nawrotów w 12 mies. niż bez. To **najtańsze** narzędzie w terapii uzależnień: 5 min dziennie, ogromny efekt długoterminowy.

01 = Pięć kategorii sygnałów (Gorski)

1 · ZMIANY W MYŚLENIU

- Romantyzowanie dawnego PPU
- „*Nie jestem już uzależniony, mogę kontrolnie*”
- Sztywność, czarno-białe myślenie
- „*Terapia jest niepotrzebna*”
- Fantazje o lapsusie z pretekstem

2 · ZMIANY W EMOCJACH

- Drażliwość, krótki łont
- Smutek bez wyraźnego powodu
- Lęk wieczorny
- Nuda, anhedonia
- Wstyd po dłuższej remisji

3 · ZMIANY W ZACHOWANIACH

- Opuszczone sesje terapii
- Brak kontaktu z siecią wsparcia
- Sprawdzanie blokerów „*czy działają*”
- Powrót do mediów społecznościowych
- Pozornie nieistotne decyzje

4 · ZMIANY W STYLU ŻYCIA

- Pogorszenie snu
- Zaniedbanie ćwiczeń / diety
- Praca po godzinach, brak balansu
- Izolacja społeczna
- Brak aktywności sensownych

5 · ZMIANY W RELACJI

Pogorszenie komunikacji z partnerką · Unikanie intymności · Kłótnie z poczuciem ofiary · Sekrety, nawet drobne · Brak wdzięczności i uznania · Pomyśli o byłej / innej osobie · Konflikt z dziećmi · Powrót do dawnych wzorców

PYTANIE	TAK	KOMENTARZ / AKCJA
Czy spałem < 7 godz. lub źle?		
Czy doświadczyłem znaczącego stresu / konfliktu?		
Czy pojawiły się myśli / fantazje PPU?		
Czy miałem kontakt z osobą z sieci wsparcia?		
Czy wykonałem rutynę self-care (ruch, dieta, ćwiczenia uważności (ang. <i>mindfulness</i>))?		
Czy podjąłem pozornie nieistotne decyzje (PND)?		

1-2 sygnały tygodniowo — normalne. Zauważ, świadomie reaguj. Bez paniki.

3-5 sygnałów tygodniowo — stan podwyższonej czujności. Konsultacja z terapeutą, więcej kontaktu z siecią.

> 5 sygnałów — stan alarmu. Plan kryzysowy: dodatkowa sesja, codzienny telefon do bliskich, weryfikacja blokerów.

Sygnały ciężkie — fantazje PPU, romantyzowanie, PND. Niezależnie od liczby — interwencja natychmiast.

Klucz: Gorski podkreśla, że **monitorowanie działa tylko wtedy, gdy jest regularny**. Pacjent, który sprawdza sygnały „czasem”, zauważa je za późno. Pacjent z codzienną 5-min praktyką zauważa je *jako pierwsze* — często wcześniej niż osoby trzecie, nawet partner/-ka czy terapeuta. Codziennność tworzy *czułość*, sporadyczne sprawdzanie jej nie daje. Praktyczna rada: **powiąż monitorowanie z istniejącą rutyną** — np. po umyciu zębów wieczorem (anchor habit). To gwarantuje wykonanie. 5 minut dziennie przez rok = 30 godzin pracy nad sobą. To wystarczy, by stać się ekspertem od własnego procesu.