

Aktywność fizyczna

Rytmiczny, umiarkowany ruch obniża objawy PTSD: reguluje autonomiczny układ nerwowy, redukuje hiperarousal, poprawia sen. Konkretne formy i bezpieczne wprowadzenie.

CZAS: 3–5 sesji tygodniowo, 30–60 min **CHARAKTER:** profilaktyka, regulacja

ŹRÓDŁO: Rosenbaum (2015); van der Kolk (2014)

JAK UŻYWAĆ

Wybierz **rytmiczną, umiarkowaną** formę ruchu (bieg, pływanie, rower, trening siłowy, joga wrażliwa na traumę). 3–5 sesji tygodniowo, 30–60 minut, regularnie przez 8–12 tygodni. Zaczynaj od 20 minut spaceru 3× w tygodniu, stopniowo dodawaj. Obserwuj sygnały ciała — niektóre formy mogą wyzwać wspomnienia.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Rosenbaum i wsp. (2015, meta-analiza 19 RCT): regularny ruch **obniża objawy PTSD o 30–40%** w skali PCL-5. van der Kolk (2014): „trauma żyje w ciele — ruch jest jednym z najpotężniejszych narzędzi wracających ciało do regulacji”. Mechanizm: ruch **zużywa** nadmiarową adrenalinę, **wzmacnia** interocepcję, **poprawia** sen i nastrój przez endorfiny.

01 ✓ Sprawdzone formy ruchu w PTSD

Wybierz formę, którą jesteś w stanie utrzymać przez 8–12 tygodni — regularność ważniejsza niż intensywność.

1 · BIEGANIE / SPACERY

Rytmiczne, długie dystansy. Solo, niedaleko domu. Bez muzyki traumatyzującej. 30–45 min × 3–4 tygodniowo.

2 · PŁYWANIE

Bardzo skuteczne. Rytm + sensoryka wody. Działa wyciszająco. 30–45 min × 2–3 tygodniowo.

3 · JAZDA ROWEREM

Rytm + przestrzeń. Trasy w parku/lesie. 30 min × 3–4 tygodniowo.

4 · TRENING SIŁOWY

Wzmacnia poczucie sprawczości. Powtarzalne, kontrolowane. 2–3 tygodniowo.

5 · SZTUKI WALKI

Boks, brazylijski jiu-jitsu, judo. Daje poczucie kontroli nad ciałem. Tylko w bezpiecznym kontekście.

6 · JOGA WRAŻLIWA NA TRAUMĘ

Trauma-Sensitive Yoga (osobna karta). Powolny ruch, bez wymuszania pozycji.

02 ✗ Form, których lepiej unikać (na początku)

INTENSYWNE KLASY GRUPOWE

CrossFit, HIIT — wysokie pobudzenie + krzyk trenera + presja czasu może wyzwać hiperarousal.

SPORTY KONTAKTOWE Z OBCYMI

Pchanie, ciągnięcie → wyzwalacze dla traumy fizycznej.

RUCH W GŁOŚNYM TŁUMIE

Wyzwalacze dla traumy publicznej (np. siłownia w godzinach szczytu).

WYCZERPUJĄCY WYSIŁEK

Pobudzenie autonomiczne podobne do reakcji walki/ucieczki — może być mylone z atakiem paniki lub flashbackiem.

03 Plan wprowadzania — pierwsze 4 tygodnie

Stopniowy plan startowy. Każdy tydzień dodaje nową aktywność lub czas.

Tydzień 1: 3× tygodniowo spacer 20 min. Bez muzyki lub uspokajająca. Spokojne miejsce.

Tydzień 2: 3× tygodniowo spacer 30 min, w jednej sesji 2–3 min lekkiego biegu.

Tydzień 3: 3× spacer + 1× inna forma (basen, rower, joga 30 min).

Tydzień 4: 4× tygodniowo 30–45 min ruchu różnymi formami. Obserwuj, co działa najlepiej.

04 Mój plan i dziennik

Wpisz konkretną formę, miejsce, czas. Po każdej sesji notuj samopoczucie.

FORMA 1 — GŁÓWNA

którą wybieram

CZĘSTOŚĆ × TYGODNIOWO

np. 3×

KONKRETNE MIEJSCE

gdzie ćwiczę

05 Dziennik (pierwsze 2 tygodnie)

#	DATA	FORMA + CZAS	SEN TEJ NOCY 0–10	NAPIĘCIE PO 0–10	NASTRÓJ 0–10
1					
2					
3					
4					
5					
6					

Klucz: Rosenbaum (2015): „regularny umiarkowany ruch jest jedną z najtańszych i najlepiej dostępnych interwencji w PTSD — ale wymaga, jak każda terapia, dostosowania do osoby i konsekwencji”.