

Joga wrażliwa *na traumę*

Trauma-Sensitive Yoga (TCTSY) — adaptacja jogi dla osób z PTSD. Powolny ruch, własna decyzja o pozycji, brak korekcji dotykowej. Buduje orientację w ciele.

CZAS: 2× tygodniowo × 60 min **CHARAKTER:** regulacja, ciało

ŹRÓDŁO: Emerson & van der Kolk (2011, 2014)

JAK UŻYWAĆ

Znajdź **certyfikowanego instruktora TCTSY** (Trauma Center Trauma-Sensitive Yoga) lub program online. Zajęcia 2× tygodniowo przez 10–12 tygodni. Jeśli niedostępne — Yin joga, joga restoratywna lub praktyka w domu z podręcznikiem Emersona (2015). *Klasyczna joga (Vinyasa, Bikram, Ashtanga) może nasilić objawy PTSD* — szybkie tempo, korekcja dotykowa, presja grupy.

DLACZEGO TO DZIAŁA

van der Kolk i wsp. (2014, RCT 64 kobiety z chronicznym PTSD): 10-tygodniowy program TCTSY **obniżył objawy PTSD o 33%** w skali CAPS — w porównaniu do 5% w grupie kontrolnej. Skuteczność porównywalna z farmakoterapią. Mechanizm: *odzyskiwanie orientacji w ciele* (interocepcja) i *poczucia sprawczości* — trauma odbiera kontakt z ciałem, joga pomaga go odzyskać bezpiecznie.

01 Czym TCTSY różni się od klasycznej jogi

Te różnice nie są kosmetyczne — chronią pacjenta z PTSD przed retraumatyzacją.

KLASYCZNA JOGA

Korekcja dotykowa instruktora · język nakazujący („zrób”) · wymagana medytacja z zamkniętymi oczami · długie pozycje (1–5 min) · presja grupowa · lustra.

JOGA WRAŻLIWA NA TRAUMĘ

Brak korekcji dotykowej · język zapraszający („możesz spróbować”) · oczy otwarte (lub decyzja) · krótsze pozycje (10–30s) · małe grupy, brak rywalizacji · brak luster.

02 Kluczowe elementy bezpieczeństwa

- 1. Wybór jest zawsze Twój.** Instruktor proponuje — Ty decydujesz, czy wykonasz pozycję, w jakiej formie, jak długo.
- 2. Oczy otwarte, jeśli wolisz.** Wybór należy do Ciebie.
- 3. Brak korekcji dotykowej.** Instruktor pokazuje, nigdy nie dotyka.
- 4. Możesz wyjść w każdej chwili.** Bez tłumaczeń, bez przeprosin.
- 5. Sygnalizacja niewerbalna.** Uniesienie ręki sygnalizuje potrzebę pauzy.
- 6. Małe grupy.** Maksymalnie 8–10 osób, brak rywalizacji.

03 Alternatywy, jeśli nie ma TCTSY w okolicy

Kilka opcji, gdy nie możesz znaleźć certyfikowanego instruktora.

1 · YIN JOGA

Bardzo powolne tempo, długie pozycje na podłodze. Bez napięcia. Sprawdź instruktora — jeśli stosuje korekcję dotykową, poproś o jej brak.

2 · JOGA RESTORATYWNA

Pozycje wspierane poduszkami, kocami. Brak wysiłku. Idealna dla osób z hiperarousal.

3 · JOGA W DOMU Z PODRĘCZNIKIEM

Emerson „*Trauma-Sensitive Yoga in Therapy*” (2015). Aplikacje: *Yoga with Adriene* ma serię „*Yoga for trauma*”.

4 · INDYWIDUALNE LEKCJE

Pojedyncze sesje z instruktorem poza grupą — możliwość pełnej kontroli, dialogu o potrzebach.

04 Sygnały, że trzeba przerwać / zmienić

Podczas sesji: flashback, atak paniki, intensywne intruzje, dysocjacja, łzy nie do opanowania → wyjdź, użyj uziemienia 5-4-3-2-1.

Po sesji: nasilenie koszmarów, wzmożona drażliwość, wycofanie społeczne, intensywne wspomnienia → przerwij na 1-2 tygodnie, omów z terapeutą.

W relacji z instruktorem: dyskomfort, niezrozumienie potrzeb traumy → zmień instruktora lub studio.

05 Mój plan

FORMA JOGI, KTÓREJ SPRÓBUJĘ

TCTSY / Yin / restoratywna / dom

GDZIE

studio / dom / instruktor indywidualny

CZĘSTOŚĆ × TYGODNIOWO

Z KIM POROZMAWIAM PRZED STARTEM

terapeuta, instruktor

Klucz: Emerson i van der Kolk (2014): „joga wrażliwa na traumę nie uczy nowych pozycji — uczy ponownego zaufania własnemu ciału po doświadczeniu, które to zaufanie zniszczyło”. Cel: orientacja w ciele, nie elastyczność.