

Oddychanie 4-7-8

Najszybsza biologiczna droga do uspokojenia układu nerwowego po traumie. Wydłużony wydech aktywuje nerw błędny — w 2–3 minuty zmienia stan ciała. Działa, nawet gdy myśli nie pomagają.

CZAS: 2–5 min na sesję Codziennie 2–3× w spokoju + w kryzysie

ŹRÓDŁO: Porges (2011); Brown & Gerbarg (2005)

JAK UŻYWAĆ

Oddychanie 4-7-8 (Andrew Weil, oparte na pranayamie): **wdech nosem licząc do 4** · **wstrzymanie oddechu na 7** · **wydech ustami licząc do 8**. Wykonaj 4 cykle. To około 2 minuty. Wykonuj *codziennie 2–3 razy w spokoju* (rano po przebudzeniu, w południe, przed snem) — wtedy w nagłej sytuacji organizm sięga po znaną sekwencję. Jeśli wstrzymanie do 7 jest trudne, zacznij od 4-4-6 i stopniowo wydłużaj. Kluczowy element to **wydech dłuższy od wdechu**.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Wydłużony wydech **aktywuje nerw błędny** (brzuszny X nerw czaszkowy) — element przywspółczulnego układu nerwowego odpowiedzialnego za stan spokoju i społecznego zaangażowania. Porges (2011) w teorii poliwalnej wykazał, że *zmienność rytmu serca* (HRV) — biologiczny marker funkcji nerwu błędnego — rośnie po kilku cyklach oddychania z wydłużonym wydechem. Brown i Gerbarg (2005) opisali, że już 2 minuty takiego oddychania *mierzalnie obniżają* kortyzol, tętno i ciśnienie krwi. W PTSD oznacza to: powrót do okna tolerancji *od strony ciała*, gdy myśli nie pomagają. To narzędzie nie jest „relaksacją” — to **bezpośrednia interwencja biologiczna**, działająca tak samo niezawodnie jak włącznik światła.

01



Sekwencja 4-7-8

PRZYGOTOWANIE

Usiądź wygodnie lub połóż się. Język lekko dotyka podniebienia za górnymi zębami. Zrób pełny wydech ustami (z syknięciem). Teraz zamknij usta — wdychać będziesz nosem.

CYKL PEŁNY

1. Wdech *nosem* licząc w myślach do 4.
2. Wstrzymanie oddechu licząc do 7.
3. Wydech *ustami* z lekkim syknięciem licząc do 8.
4. To jeden cykl. Powtórz 4 razy.



jeden cykl · powtórz 4 razy

02 Kiedy używać — pięć sytuacji

PO PRZEBUDZENIU

Gdy pojawia się poranny lęk lub myśli wracają do traumy. Włącz oddech zaraz po otwarciu oczu, leżąc.

PRZED SNEM

Pomaga zasnąć i obniża antycypację koszmaru. Wykonaj w łóżku, z zamkniętymi oczami.

PO WYZWAŁACZU

Gdy zauważasz sygnał ostrzegawczy (tętno wzrasta, klatka napięta) — wykonaj 4 cykle *przed* pełną reakcją.

W KRYZYSIE

W trakcie nadpobudzenia, paniki. Część osób w pełnej panice nie da rady wstrzymać 7 s — zmień na 4-4-6.

03 Co jeśli nie działa lub gorzej

ZAWROTY GŁOWY

Zwykle hiperwentylacja — wdychasz zbyt głęboko. Zmniejsz objętość wdechu o połowę, zachowaj proporcje czasów.

NASILENIE LĘKU PRZY WSTRZYMANIU

U niektórych osób z PTSD wstrzymanie oddechu wyzwała lęk (poczucie utknięcia). Zmień na 4-4-6 lub na samo wydłużenie wydechu (wdech 4, wydech 6).

PIERWSZE PRÓBY NIESKUTECZNE

Mózg potrzebuje 2-3 tygodni ćwiczenia, by sięgać po sekwencję automatycznie. W kryzysie działa to, co ćwiczono *zawczasu*.

ZBYT INTENSYWNE EMOCJE WRACAJĄ

Świadome oddychanie u części osób uwalnia tłumione emocje. To *normalne*. Jeśli zbyt intensywne — przerwij, użyj ugruntowania 5-4-3-2-1.

04 Dziennik praktyki · tydzień

DZ.	RANO <i>tak/nie</i>	WIECZOREM <i>tak/nie</i>	STAN PRZED <i>0-10</i>	STAN PO <i>0-10</i>	CO ZAUWAŻYŁEM/-AM
<i>Pn</i>					
<i>Wt</i>					
<i>Śr</i>					
<i>Cz</i>					
<i>Pt</i>					
<i>Sb</i>					
<i>Nd</i>					

Klucz: oddychanie 4-7-8 to jedna z *nielicznych technik*, które **natychmiastowo i mierzalnie** zmieniają stan ciała. Brown i Gerbarg (2005) pokazali, że po 4 cyklach: tętno spada o 5-10 uderzeń, ciśnienie skurczowe o 5-8 mm Hg, HRV rośnie. To biologia, nie wiara. Pracuje, nawet jeśli wątpisz, czy zadziała.