

Trzy odpowiedzi *na zagrożenie*

Walka, ucieczka, zamrożenie — automatyczne reakcje ciała, decydowane w ułamku sekundy. Często mamy dominującą. Rozpoznanie swojej pomaga zrozumieć przeszłość bez wstydu i pracować nad reakcjami obecnymi.

CZAS: 25 min — wypełnienie Po stabilizacji wstępnej

ŹRÓDŁO: Porges (2011); Levine (1997, somatic experiencing)

JAK UŻYWAĆ

Gdy ciało wykrywa zagrożenie, układ nerwowy autonomiczny wybiera jedną z **trzech reakcji**: **1) walka** (gniew, konfrontacja, kontratak), **2) ucieczka** (panika, oddalenie się, lęk, ruch w bok), **3) zamrożenie** (paraliż, dysocjacja, „udawanie martwego”, odrętwienie). Czwarta forma czasem wymieniana to **uległość** (fawn) — zaspokajanie wymagań napastnika dla bezpieczeństwa. Każdy ma *biologiczną domyślną* reakcję, ukształtowaną przez doświadczenia (zwłaszcza wczesne) i kontekst sytuacji. Twoja dominująca w sytuacji traumy nie była *wyborem* — była najtrafniejszą odpowiedzią Twojego układu nerwowego w tamtej chwili.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Wiele osób z PTSD **obwinia się** za swoją reakcję w traumie. „Powinienem być walczyć”, „Dlaczego nie uciekłem/-am?”, „Tylko stałem/-am”. Te wyrzuty są *nieprawdziwe biologicznie*: ciało wybrało reakcję w 12 milisekundach, na podstawie czynników, na które nie miałeś/-eś wpływu (przewaga siły, możliwość ucieczki, izolacja, wiek, wcześniejsze traumy). Porges (2011) i Levine (1997) pokazali, że **zamrożenie** — najczęściej oceniane jako „pasywne” — jest właśnie ewolucyjnie *najstarsze i najmądrzejsze*, gdy walka i ucieczka byłyby śmiertelne. Rozpoznanie własnej dominującej reakcji jest pierwszym krokiem do **współczucia dla siebie** — zamiast obwiniania. To także podstawa pracy terapeutycznej: różne dominujące wymagają różnych technik regulacji.

01 Cztery reakcje — opisy

WALKA

Aktywacja: układ współczulny, adrenalina, mięśnie napięte do działania.
Emocje: gniew, wściekłość, oburzenie, gotowość do konfrontacji.
Zachowania w traumie: krzyk, opór fizyczny, atak.
Po traumie: drażliwość, wybuchy gniewu, konfrontacyjność, „kłótniowość”.

UCIECZKA

Aktywacja: układ współczulny, adrenalina, mięśnie do biegu.
Emocje: panika, lęk, potrzeba „natychmiastowego oddalenia”.
Zachowania w traumie: oddalenie się, krzyk o pomoc, wybieganie.
Po traumie: unikanie, ruchliwość, niepokój, „nigdzie nie mogę usiedzieć”.

ZAMROŻENIE

Aktywacja: grzbietowy nerw błędny, spadek tętna, dystans od ciała.
Emocje: otępienie, pustka, „nie ma mnie tu”, dystans.
Zachowania w traumie: paraliż, brak ruchu, dysocjacja.
Po traumie: apatia, mgła poznawcza, wycofanie, odrętwienie emocjonalne.

ULEGŁOŚĆ

Aktywacja: mieszana — częściowy układ współczulny + społeczne zaangażowanie.
Emocje: chęć zaspokojenia, lęk przed gniewem drugiego.
Zachowania w traumie: uległość, zgoda, „proszę cię, nie”.
Po traumie: people-pleasing, brak granic, trudność w „nie”, przeproszanie.

02 ‣ Moja dominująca reakcja — sprawdź

Pomyśl o trudnych sytuacjach (nie necessarily samej traumie) i zaznacz typowe reakcje. Niektórzy mają jedną dominującą, niektórzy — mieszankę dwóch.

WALKA

- ☐ W konflikcie reaguję ostro, słownie lub fizycznie
- ☐ Łatwo wpadam w gniew przy poczuciu zagrożenia
- ☐ Tendencja do konfrontacji niż unikania
- ☐ „Najlepsza obrona to atak”
- ☐ Drażliwość, krótka „lont”

UCIECZKA

- ☐ Pierwszą reakcją jest „wyjść”, „odejść”
- ☐ Panikuję i czuję natychmiastową potrzebę ruchu
- ☐ Unikam konfliktów przez fizyczne oddalenie
- ☐ Trudno mi „siedzieć z czymś”
- ☐ Niepokój ruchowy, kompulsywna aktywność

ZAMROŻENIE

- ☐ Pod stresem „wyłączam się”, paraliż
- ☐ „Nie wiem, co czuję”, odrętwienie
- ☐ W trudnych sytuacjach milczę, dystansuję się od ciała
- ☐ Po fakcie żałuję, że „nic nie zrobiłem/-am”
- ☐ Mgła poznawcza, „pustka”

ULEGŁOŚĆ (FAWN)

- ☐ Pod stresem chcę zaspokoić oczekiwania drugiej osoby
- ☐ Trudno mi mówić „nie”, nawet gdy potrzebuję
- ☐ Przepraszam, gdy ktoś jest niegrzeczny wobec mnie
- ☐ Stawiam potrzeby innych przed swoimi automatycznie
- ☐ „Lepiej żeby nie był/-a zła/-y na mnie”

03 ◎ Techniki dopasowane do dominującej reakcji

WALKA — WYCISZ

Długi wydech (4-6 oddech), intensywny ruch z rytmem (boks z workiem, bieg), zimna woda na twarz. Spalenie nadmiaru energii bezpiecznie.

UCIECZKA — UGRUNTUJ

Stopy mocno na podłodze, ugruntowanie 5-4-3-2-1. Świadome zostanie w miejscu przez 30 sekund. Mówienie sobie: „jestem tu, jestem bezpieczny/-a”.

ZAMROŻENIE — POBUDŹ ŁAGODNIE

Powolny ruch, krótki spacer, ciepły lub chłodny prysznic, intensywny smak (mięta, cytryna). Łagodnie — nie intensywny ruch (eskaluje).

ULEGŁOŚĆ — ZAUWAŻ SIEBIE

Pytanie: „czego ja teraz potrzebuję?”. Wprowadzenie drobnej pauzy przed odpowiedzią. Ćwiczenie wypowiadania własnej preferencji w bezpiecznych sytuacjach.

Klucz: Twoja reakcja w traumie *nie była wyborem* — była automatyczną odpowiedzią układu nerwowego, ukształtowaną przez biologię i historię. **Najczęstsza reakcja podczas trudnych traum (przemoc, gwałt, napaść) to zamrożenie**, nie walka czy ucieczka. To nie pasywność — to przeżyciowa mądrość ciała. Levine (1997) pokazał, że właśnie zamrożenie ratuje życie w sytuacjach, gdzie walka byłaby samobójcza. Wyrzuty „dlaczego się nie broniłem/-am?” są *oceną z perspektywy ex post*, której Twój układ nerwowy nie miał. Współczucie dla siebie nie jest słabością — jest dokładnym opisem rzeczywistości.