

Uścisk *motylkowy* (BLS)

Krzyżujesz ręce na klatce piersiowej i naprzemiennie postukujesz w ramiona. Krótka technika stabilizacyjna oparta na obustronnym pobudzeniu (BLS).

CZAS: 3–5 min **CHARAKTER:** stabilizacja, regulacja **ŹRÓDŁO:** Artigas i Jarero (1998); Shapiro (2018)

JAK UŻYWAĆ

Skrzyżuj ręce na klatce piersiowej tak, by *prawa dłoń* spoczywała na *lewym* ramieniu, a *lewa* na *prawym*. Postukuj naprzemiennie: **lewa-pauza-prawa-pauza**, tempo 1 stuknięcie na 1–2 sekundy. Kontynuuj 1–5 minut. Wykonuj jako technikę uspokajającą — skup uwagę na oddechu lub poczuciu bezpieczeństwa.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Artigas i Jarero (1998): „*uścisk motylkowy łączy obustronne pobudzenie z autoregulacją — pacjent może go wykonać samodzielnie*”. Mechanizm (Shapiro 2018): obustronne pobudzenie (ang. *bilateral stimulation*, BLS) obniża intensywność emocjonalną przez aktywację *obu półkul* mózgu i utrudnienie *jednoczesnego* utrzymywania pobudzenia + zadania uwagowego. Skuteczne przed snem, po wyzwalczu, w drodze po trudnym dniu.

01 Pozycja i tempo

Pozycja: siad lub stojąco, stopy płasko, plecy proste. Tempo wolne, nie szybko.

1 · SKRZYŻOWANIE RĄK

Prawa dłoń na lewym ramieniu, lewa na prawym. Palce u góry, kciuki dotykają obojczyków. Pozycja "motyla ze złożonymi skrzydłami".

2 · OCZY

Zamknięte *lub* patrz w dół. Jeśli zamknięcie wywołuje lęk — otwórz, wzrok na neutralnym punkcie.

3 · TEMPO STUKANIA

1 stuknięcie na 1–2 sekundy. *Wolno*, nie szybko. Postukaj lewą, pauza, prawą, pauza, powtarzaj.

4 · CZAS

1–5 minut. Kontynuuj do momentu spadku intensywności emocji/myśli.

02 Kiedy stosować

W CIĄGU DNIA

Po wyzwalczu w pracy/szkole. W łazience, samochodzie, cichym miejscu. 1–3 minuty.

PRZED SNEM

Gdy myśli atakują, nie pozwalają zasnąć. 5 minut przed łóżkiem.

PO KOSZMARZE

Wstaję z łóżka, idę do kuchni, robię BLS 5 minut. Potem mogę wrócić do snu.

RUTYNA PORANNA

Dla osób z C-PTSD — 5 minut rano jako profilaktyka stabilizacji przed dniem.

03 Mój dziennik praktyki

Po każdej próbie zapisz krótko. Z czasem zauważysz, w jakich sytuacjach najbardziej pomagasz.

#	DATA	SYTUACJA	CZAS <i>min</i>	NAPIĘCIE PRZED <i>0–10</i>	NAPIĘCIE PO <i>0–10</i>
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

04 Co działa najlepiej u mnie

NAJLEPSZY MOMENT DNIA

kiedy mi pomaga najbardziej

MIEJSCE, GDZIE MOGĘ PRAKTYKOWAĆ

dom, praca, gdzie indziej

OBSERWACJE

co zauważyłem/-am po 1–2 tygodniach

Klucz: Artigas i Jarero (1998): „*uścisk motylkowy jest pierwszym narzędziem, którego pacjent uczy się w terapii traumy — daje natychmiastową ulgę i poczucie sprawczości*”. Powtarzaj regularnie — efekt rośnie z praktyką.