

Testowanie „wtedy vs teraz”

Wyzwalacze w PTSD aktywują pamięć traumy tak, jakby zagrożenie działało się **TERAZ**. Świadome porównywanie „co było wtedy” z „co jest teraz” — by mózg nauczył się rozróżnienia.

CZAS: 5–10 min na wyzwalacz **CHARAKTER:** restrukturyzacja pamięci

ŹRÓDŁO: Ehlers & Clark (2000) — CT-PTSD

JAK UŻYWAĆ

Gdy wyzwalacz aktywuje pamięć traumy (intensywna reakcja na zapach, dźwięk, sytuację), **zatrzymaj się**. Opisz w 3–5 punktach sensorycznych **WTEDY** (co widziałeś/-aś, słyszałeś/-aś, czułeś/-aś w chwili traumy) i **TERAZ** (co widzisz, słyszysz, czujesz w tej chwili). Powiedz na głos: „to było wtedy. Teraz jest [rok]. Jestem bezpieczny/-a w [miejsce]”.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Ehlers i Clark (2000): „kluczowy mechanizm utrzymywania PTSD to **brak rozróżnienia** między obecnymi bodźcami a pamięcią traumy”. Wyzwalacz uruchamia reakcję, jakby zagrożenie wracało. Sama wiedza „to było dawno temu” nie wystarcza — mózg z PTSD potrzebuje **doświadczenia różnicy**. Trening: 5–10 powtórzeń daje wyraźną redukcję intensywności.

01 Procedura — 6 kroków

Wykonuj w chwili pojawienia się wyzwalacza, gdy reakcja jest jeszcze świeża.

1. Zauważ wyzwalacz. Co się właśnie stało? Zapach, dźwięk, słowo, sytuacja.
2. Oceń intensywność „włączenia” pamięci traumy (0–10).
3. Opisz **WTEDY** — 3–5 punktów sensorycznych (co widziałem/-am, słyszałem/-am, czułem/-am, kto był, jaki rok).
4. Opisz **TERAZ** — 3–5 punktów (co widzę, słyszę, czuję pod stopami, kto tu jest, jaki rok mamy).
5. Powiedz na głos: „to było wtedy. Teraz jest [rok]. Jestem w [miejsce]. Jestem bezpieczny/-a tu i teraz”.
6. Sprawdź intensywność po (0–10). Zwykle spada o 2–4 punkty.

02 Przykład — zapach alkoholu od współpracownika

Trauma: przemoc ojca pod wpływem.

WTEDY — MAM 9 LAT

Widzę: ciemny salon, ojciec wchodzi do pokoju · Słyszę: trzaśnięcie drzwiami, krzyk · Czuję: serce wali, drżenie · Obecni: ojciec, mama (przerażona) · Rok: 1998, wiek 9 lat.

TERAZ — MAM 34 LATA

Widzę: jasne biuro, ekran komputera, niebieskie ściany · Słyszę: klawiatura, rozmowa w kuchni · Czuję: stopy na podłodze, oparcie krzesła pod plecami · Obecni: koledzy z pracy (neutralni) · Rok: 2024, wiek 34 lat. Intensywność spadek z 8/10 do 4/10.

03 Mój eksperyment — porównanie WTEDY/TERAZ

Wypełnij w chwili wyzwalacza, gdy reakcja jest świeża.

WYZWALACZ

co konkretnie się stało — zapach, dźwięk, sytuacja

Intensywność brak 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

maks.

04 WTEDY vs TERAZ — tabela

SENSORYCZNIE	WTEDY	TERAZ

05 Końcowe stwierdzenie

POWTARZAM NA GŁOS

np. „To było wtedy. Teraz jest 2024. Jestem w biurze. Jestem bezpieczny/-a”

Intensywność
po brak 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

maks.

Klucz: Ehlers i Clark (2000): „mózg z PTSD nauczył się reagować, jakby trauma trwała. Eksperyment „wtedy vs teraz” daje mu doświadczenie różnicy — z czasem tworzy nową, kontekstową pamięć”. Powtarzaj systematycznie.