

Eksperyment: *kontrolowany dyskomfort*

Testujesz myśl „nie dam rady, jeśli będzie trudno”. Rezyliencja nie rośnie w komforcie, lecz na jego granicy. Mała dawka dyskomfortu, regularnie, buduje odporność na większy stres.

CZAS: 15 min · poziom średni · Unikanie; lęk przed dyskomfortem; budowanie odporności

ŹRÓDŁO: Meichenbaum (1985); Dienstbier (1989)

JAK UŻYWAĆ

Ten arkusz to eksperyment behawioralny sprawdzający przekonanie „nie przetrwam, jeśli będzie trudno lub nieprzyjemnie”. Przez tydzień, codziennie, wybierasz **jeden umiarkowany, kontrolowany dyskomfort** — np. 30 s chłodnej wody na końcu prysznica, krótką rozmowę z nieznanym, kilkanaście minut ciszy bez telefonu, lekki wysiłek fizyczny albo asertywne „nie”. Za każdym razem zapisujesz **przewidywany** poziom dyskomfortu (0–10) przed i **rzeczywisty** po. Najpierw oceniasz pewność obawy „nie dam rady” (0–100%), a po serii prób — ponownie. Skala napięcia przed i po pokazuje efekt.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Działa tu prosta zasada: **mała, kontrolowana dawka** dyskomfortu buduje odporność na większy stres — podobnie jak stopniowy trening wzmacnia ciało. Unikanie utrwała przekonanie „nie dam rady”, bo nigdy nie zbierasz dowodów, że jest inaczej. Eksperyment dostarcza tych dowodów: zwykle **przewidywany** dyskomfort (np. 8/10) okazuje się wyraźnie wyższy niż **rzeczywisty** (np. 4/10) — „było łatwiej, niż myślałem” — a samo poradzenie sobie podnosi poczucie sprawczości. Kluczowe są dwie zasady bezpieczeństwa: dyskomfort ma być **umiarkowany i stopniowany** (mała dawka regularnie, nie wielka naraz), bo zbyt intensywny wywołuje wycofanie i potwierdza obawę. Tej techniki **nie** stosuje się w aktywnej traumie ani w kryzysie — najpierw potrzebna jest stabilizacja.

Napięcie /

pobudzenie

spokój

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

maksymalne

— PRZED

01



Przykłady łagodnych dyskomfortów

- 30 s chłodnej wody na końcu prysznica (kontrolowany bodziec fizyczny)
- krótka rozmowa z nieznanym (dyskomfort społeczny)
- kilkanaście minut ciszy bez telefonu (dyskomfort nudy)
- lekki wysiłek fizyczny · asertywne „nie” wobec kogoś

02



Moje przekonanie + wybór

Zapisz obawę („nie dam rady, jeśli...”) i pewność (0–100%). Wybierz jeden umiarkowany dyskomfort na dziś.

OBAWA + PEWNOŚĆ (%) + WYBRANY DYSKOMFORT

03 Przewidywanie vs rzeczywistość

Przed: jak trudne to będzie (0–10)? Po: jak trudne było naprawdę (0–10)? Czy przetrwałeś? Zapisz dla kilku prób.

DYSKOMFORT: PRZEWIDYWANY ___ / RZECZYWISTY ___

04 Mój wniosek

Po serii prób ponownie oceń pewność obawy (0–100%). Czego się nauczyłeś o swojej zdolności radzenia sobie?

PEWNOŚĆ PO (%) + WNIOSEK

Napięcie /
pobudzenie
— PO

spokój 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

maksymalne

Klucz: rezyliencja nie rośnie w komforcie, lecz na jego granicy. Przewidywany dyskomfort niemal zawsze jest wyższy niż rzeczywisty. Mała dawka regularnie, nie wielka naraz. Różnica na skali przed/po to Twoja miara.

Nie stosuj tej techniki w aktywnej traumie ani w kryzysie — najpierw potrzebna jest stabilizacja. Dobieraj dyskomfort umiarkowanie i stopniowo.