

Antycypacja — *dni przed*

Wesele za 2 tygodnie. Prezentacja za 4 dni. Spotkanie integracyjne we czwartek. Lęk antycypacyjny zaczyna się na długo przed sytuacją — i bez interwencji potrafi pochłonąć wszystkie zasoby przed wydarzeniem.

CZAS: 15 min × 3 punkty czasowe Wykonaj raz dla każdego dużego wydarzenia

ŹRÓDŁO: Hinrichsen & Clark (2003); Brozovich & Heimberg (2008)

JAK UŻYWAĆ

1 · Wypisz nadchodzące wydarzenie i swoje przewidywania (sekcja 01). **2** · Wykonaj 3 kontrolne punkty czasowe: *7 dni przed*, *3 dni przed*, *1 dzień przed* (sekcja 02). W każdym punkcie wpisz: lęk, główne myśli, plan działania. **3** · Zastosuj *strategię trzech kanałów* (sekcja 03): unikanie, przygotowanie, dystans — co robisz, kiedy. **4** · Po wydarzeniu wpisz, co realnie się stało (sekcja 04) — porównaj z przewidywaniem.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Lęk antycypacyjny ma *inną* dynamikę niż lęk w sytuacji: rośnie powoli, fluktuuje, czasem osiąga szczyt 1–2 dni przed wydarzeniem, czasem na 30 min przed. Bez planu pacjent *cały czas* myśli o wydarzeniu — używa to 80% poznawczych zasobów dziennie. Strukturalna praca z antycypacją skupia uwagę na *konkretnych punktach*, zamiast pozwalać myślom krążyć cały czas. Po 3 cyklach pracy z antycypacją pacjenci raportują *50% spadek wpływu lęku antycypacyjnego na codzienne życie* (Brozovich & Heimberg 2008).

01 ● Wydarzenie

CO SIĘ WYDARZY

— kiedy, gdzie, z kim, co Twoja rola

NAJGORSZY SCENARIUSZ

— jednym zdaniem

REALISTYCZNY SCENARIUSZ

— co najprawdopodobniej się stanie

NAJLEPSZY SCENARIUSZ

— co byłoby idealnie

02 📅 Trzy punkty czasowe

PUNKT	LĘK	GŁÓWNE MYŚLI	PLAN DZIAŁANIA
<i>7 dni przed</i>			
<i>3 dni przed</i>			
<i>1 dzień przed</i>			

03 Strategia trzech kanałów

Gdy myśl o wydarzeniu wraca w trakcie dnia, masz **trzy** kanały reakcji — w zależności od momentu i typu myśli.

1 • UNIKANIE POZNAWCZE

myśli krążące, nieprzydatne

„Już myślałem/-am o tym 10 razy”. *Wracaj do zajęcia.*

Najsilniej: ruch fizyczny, kontakt z drugą osobą, intensywne zadanie.

Limit: 30 min myślenia o wydarzeniu dziennie. Kropka.

2 • PRZYGOTOWANIE

myśli produktywne, konkretne

„Co mogę faktycznie zrobić?”.

Zarezerwuj *jedną* sesję 30 min na konkretne kroki: co kupić, co przygotować, kogo zapytać.

Po sesji — **zamknij** temat. Wracaj do niego dopiero w kolejnej sesji.

3 • DYSTANS

myśli katastroficzne

„Wszyscy mnie ocenią”. Użyj defuzji: „mam myśl, że...”. Albo restrukturyzacji (handout „Myśli przed sytuacją”).

Nie próbuj walczyć z myślą — *oddziel* się i wracaj do bieżącej chwili.

04 Po wydarzeniu — porównanie

CO REALNIE SIĘ STAŁO

— fakty, nie interpretacje

KTÓRY SCENARIUSZ Z SEKCJI 01 NAJLEPIEJ PASUJE

— najgorszy / realistyczny / najlepszy

CZEGO NAUCZYŁEM/-AM SIĘ O SWOIM LĘKU ANTYCYPACYJNYM

Klucz: w 80–90% przypadków pacjenci z lękiem społecznym przewidują *najgorszy* scenariusz, a rzeczywistość pasuje do *realistycznego*. Każda taka obserwacja jest dowodem, że Twój system przewidywania jest **kalibrowany na zagrożenie** — nie na fakty. Po 5–7 cyklach pracy z antycypacją mózg uczy się: „zwykle nie jest tak źle, jak się obawiam”. To podstawowy mechanizm zmiany w lęku antycypacyjnym (Hinrichsen & Clark 2003).