

Eksperyment *behawioralny*

Wejdź dwa razy w tę samą sytuację społeczną: raz z zabezpieczeniami, raz bez. Porównaj rzeczywiste wyniki. To najsilniejszy sposób, by przekonanie „muszę się chronić” osłabło.

CZAS: 1 sesja planowania + 2 wykonania W ciągu 7–10 dni

ŹRÓDŁO: Bennett-Levy i wsp. (2004); Clark (2001)

JAK UŻYWAĆ

1 · Wybierz *jedną* sytuację społeczną, w której zwykle używasz zabezpieczeń (sekcja 01). **2** · Wypisz przewidywanie: co się stanie z zabezpieczeniami, co bez (sekcja 02). **3** · Wykonaj z zabezpieczeniami. Zanotuj wynik. **4** · Po 2–3 dniach wykonaj tę *samą* sytuację *bez* zabezpieczeń. Zanotuj wynik. **5** · Porównaj — co rzeczywiście się stało (sekcja 04).

DLACZEGO TO DZIAŁA

Mózg uczy się **z porównania**, nie z teorii. Możesz tysiąc razy czytać „zabezpieczenia nie pomagają” — to nie zmieni przekonania. Ale jedno realne doświadczenie, w którym *bez* zabezpieczeń sytuacja poszła równie dobrze (lub lepiej), przesunęła wagę dowodów. To jest serce *terapii poznawczo-behawioralnej* — eksperymenty behawioralne mają wpływ na zmianę 2–3× silniejszy niż sama dyskusja poznawcza (Bennett-Levy 2003).

01 = Wybór sytuacji

SYTUACJA SPOŁECZNA

— konkretna, powtarzalna

MOJE ZABEZPIECZENIA

— 2–3 najczęstsze w tej sytuacji

02 Przewidywanie — co się stanie

Zanim wykonasz, wpisz prognozę dla obu wariantów. Im konkretniej, tym lepszy test.

ASPEKT	Z ZABEZPIECZENIAMI	BEZ ZABEZPIECZEŃ
Mój lęk w trakcie (0–10)		
Co rozmówca pomyśli o mnie (konkretnie)		
Czy zauważy moje objawy (tak/nie + jak)		
Najgorsze, co może się stać (jedno zdanie)		

03 ☉ Wykonanie — wpisz po każdej sytuacji

A · Z ZABEZPIECZENIAMI

Data wykonania:

Lęk w trakcie (0-10):

Co się faktycznie stało:

B · BEZ ZABEZPIECZEŃ

Data wykonania:

Lęk w trakcie (0-10):

Co się faktycznie stało:

04 ✨ Wnioski — porównanie wariantów

CO POSZŁO INACZEJ, NIŻ PRZEWIDYWAŁEM/-AM

CO STAŁO SIĘ *BEZ* ZABEZPIECZEŃ, CO MNIE ZASKOCZYŁO

NOWE PRZEKONANIE PO EKSPERYMENCIE

— zamiast „muszę użyć zabezpieczenia”

Klucz: w 80–90% eksperymentów behawioralnych z odstawieniem zabezpieczeń pacjenci raportują: (a) sytuacja poszła równie dobrze lub lepiej, (b) lęk po pierwszych 2–3 min był niższy, nie wyższy, (c) rozmówca nie zauważył objawów, których pacjent się obawiał. To powtarzalny wynik (Wells & Papageorgiou 2001; Clark i wsp. 2003). Twój eksperyment jest **jednym z tych dowodów** — niezależnie od tego, czy pójdzie idealnie.