

Jedzenie i picie *przy ludziach*

Szczególny podtyp lęku społecznego (czasem łączony z lękiem przed wystąpieniami): drżenie rąk przy kubku, lęk przed zakrztuszeniem, „wszyscy patrzą jak jem”. Drabina ekspozycji dopasowana do tej sytuacji.

CZAS: 6–8 tygodni stopniowanej praktyki 3–5 powtórzeń na każdy szczebel

ŹRÓDŁO: Heimberg (2002); Hofmann & Otto (2008)

JAK UŻYWAĆ

1 · Przeczytaj 12-szczeblową drabinę specyficzną dla jedzenia/picia (sekcja 01). **2** · Wybierz szczebel z przewidywanym lękiem 3–5/10 jako start. **3** · Wykonuj *bez zachowań zabezpieczających* — bez ćwiczenia rąk, bez obserwowania, czy ktoś patrzy. **4** · 3–5 powtórzeń na szczebel — wpisz w sekcji 03. **5** · Po opanowaniu rób też mini-ekspozycje (sekcja 02): świadomie rozlej trochę, świadomie zakaszl.

DLACZEGO TO DZIAŁA

W tej formie lęku społecznego dochodzi *specyficzna obawa*: drżenie rąk widoczne przy podnoszeniu sztućców, kubka, kieliszka. Im bardziej kontrolujesz dłoń („musi nie drżeć”), tym **silniej** drży — to fizjologiczny paradoks (Tucker & Williamson 1984). Ekspozycja stopniowana *bez kontroli* uczy mózg, że drżenie zwykle jest *niewidoczne*, a nawet gdy widoczne — *nikt nie reaguje*. Po 6 tygodniach pacjenci raportują *spadek lęku w 75% sytuacji jedzenia* (Heimberg 2002).

01 Drabina — 12 szczebli

LP.	SYTUACJA	LĘK	DATY
1	Picie wody ze szklanki w pustej kawiarni		
2	Picie kawy / herbaty w kawiarni z 5+ obcymi ludźmi		
3	Zjedzenie ciastka / kanapki w parku przy ludziach		
4	Zamówienie i wypicie zupy przy stoliku w restauracji		
5	Jedzenie obiadu przy stoliku ze znajomymi		
6	Zamówienie kieliszka wina i picie w restauracji		
7	Jedzenie w stołówce w pracy / na uczelni przy 10+ osobach		
8	Krojenie steku / dania wymagającego sztućców		
9	Jedzenie na imprezie / przyjęciu rodzinnym		
10	Jedzenie podczas rozmowy biznesowej (lunch)		
11	Wzniesienie toastu z kieliszkiem w ręce		
12	Jedzenie i prowadzenie wystąpienia naprzemiennie (np. konferencja)		

Trzy zasady: (1) *nie* ćwicz dłoni przed sytuacją — to zabezpieczenie; (2) *nie* sprawdzaj, czy ktoś patrzy — kieruj uwagę na rozmówcę albo na smak; (3) jeśli rozlejesz — *nie* przepraszaj 5 razy, tylko: „przepraszam, łapie ścierkę” i wracasz do rozmowy.

02 Mini-ekspozycje na „katastrofę”

Gdy opanujesz szczeble 1–6, dodaj *świadome* wpadki przy stoliku. To uczy mózg, że nawet realna „katastrofa” przy jedzeniu nie powoduje odrzucenia.

A • Lekko

- rozlej kilka kropli wody przy nalewaniu (z dzbanka)
- upuść serwetkę na podłogę i podnieś
- zakaszl raz głośno przy stoliku

B • Średnio

- poproś o zmianę dania („to nie to, co zamówiłem/-am”)
- upuść widelec — poproś o nowy
- napij się z niewłaściwego kieliszka

C • Wyżej

- zwróć cały rachunek („mogę dostać refundację za zupę?”)
- jedz z plamą na koszuli (świadomie)
- poproś o opcję, której nie ma w menu („mogę poprosić cytrynę do herbaty?”)

D • Szczyt

- pomył restaurację, wejdź, zorientuj się, wyjdź („pomyłka, sorry!”)
- zażądaj 2 darmowych dolewki kawy
- poproś o zniżkę w restauracji „bo to mój dzień zwykły”

03 Dziennik szczebli — 6 tygodni

TYDZ.	SZCZEBEL	CO KONKRETNIE ZROBIŁEM/-AM	LĘK SZCZYT 0–10	LĘK KONIEC 0–10
1				
2				
3				
4				
5				
6				

Klucz: drżenie rąk przy jedzeniu jest **fizjologią**, nie wadą — pojawia się u wszystkich ludzi w sytuacjach lękowych. Różnica polega na tym, że osoba bez lęku społecznego *nie* zauważa go u siebie, a osoba z lękiem traktuje jako „dowód słabości”. Po 6 tygodniach systematycznej ekspozycji większość pacjentów raportuje: „drżenie wraca, ale przestałem/-am je *obserwować* — i wtedy mija samo”. To *centralne* doświadczenie korygujące w tym podtypie SAD (Hofmann & Otto 2008).