

Lęk przed odrzuceniem

U podłoża SAD leży pierwotny lęk: „jeśli pokażę siebie, zostanę odrzucony/-a”. Trening ekspozycji na realne odrzucenie — rozmyślne pytanie o coś, na co druga osoba może powiedzieć „nie”.

CZAS: 1 prośba × 5 razy w 2 tygodnie Po opanowaniu drabiny ekspozycji (handout 2)

ŹRÓDŁO: Jiang (2017) — „Rejection Therapy”; Hofmann & Otto (2008)

JAK UŻYWAĆ

1 · Przeczytaj sekcję 01 — jak odrzucenie jest w 80% łagodne. **2** · Wybierz 5 próśb z różnych poziomów ryzyka (sekcja 02), które wykonasz w ciągu 2 tygodni. **3** · Świadomy cel: *doświadczyć odrzucenia 1-2 razy*. Bez tego nie wiesz, co się *realnie* dzieje przy „nie”. **4** · Wpisuj wyniki w sekcji 03.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Lęk przed odrzuceniem opiera się na fałszywym założeniu: „odrzucenie jest *katastrofą*”. Większość osób z lękiem społecznym *nigdy* nie doświadczyła pełnego odrzucenia — bo unika sytuacji, w których jest możliwe. Świadome poszukiwanie odrzucenia (Jia Jiang, „100 Days of Rejection”) **odwraca paradoks**: gdy *celem* jest doświadczyć „nie”, nie boisz się go już tak bardzo. W 80% przypadków odrzucenie okazuje się *łagodne, neutralne, czasem życzliwe*. Mózg uczy się: „odrzucenie istnieje, ale nie zabija” (Hofmann & Otto 2008; Jiang 2017 — popularyzacja).

01 Anatomia odrzucenia — 4 typowe reakcje

1 · Życzliwe „nie” (50%)

„Niestety nie, ale dziękuję, że pomyślałeś/-aś”. „Akurat dziś nie mogę, ale przy okazji”. *Druga osoba odmawia z szacunkiem, czasem wyjaśnia powód.*

2 · Neutralne „nie” (30%)

„Nie, dziękuję” (krótko, bez wyjaśnienia). *Druga osoba nie ma czasu lub ochoty wchodzić w temat — odmawia rzeczowo. To nie jest atak na Ciebie.*

3 · „Nie” z negocjacją (15%)

„Nie wprost, ale może pomogę ci inaczej?”. „Nie teraz, ale za miesiąc?”. *Otwiera alternatywę. Często prowadzi do lepszego rezultatu, niż gdyby od razu zgodziła się.*

4 · Niegrzeczne „nie” (5%)

Wzruszenie ramion, irytacja, krótka, niemiła odpowiedź. *To zwykle mówi więcej o stanie drugiej osoby (zmęczenie, zły dzień), niż o Tobie. Najradsze.*

Zauważ: w żadnym z 4 scenariuszy nie ma „katastrofy”, której się boisz. Nie ma ośmieszenia, ataku, publicznego upokorzenia. Ten lęk to *projekcja*, nie obserwowalna rzeczywistość (Hofmann & Otto 2008).

02 Lista próśb — 4 poziomy ryzyka

Poziom 1 · niskie ryzyko

- poproś baristę o 10% rabat („mam zły dzień”)
- zapytaj w sklepie, czy mogą obniżyć cenę
- poproś sąsiada o pożyczenie cukru
- poproś o stolik przy oknie w pełnej restauracji

Poziom 2 · średnie

- poproś szefa o godzinę wolnego w trakcie dnia
- poproś znajomego/-ą o pomoc w przeprowadzce
- zapytaj sprzedawcę o darmową próbkę nowego produktu
- poproś nieznaną osobę o zdjęcie

Poziom 3 · wyższe

- poproś znajomego/-ą o pożyczkę 200 zł
- zaproś osobę poznaną raz na kawę
- poproś klienta o referencję / opinię w pracy
- poproś szefa o podwyżkę / awans

Poziom 4 · szczyt

- poproś o randkę kogoś, kogo lubisz
- poproś o feedback krytyczny od kogoś ważnego
- poproś znajomego/-ą o szczerą opinię o sobie
- poproś o pomoc w trudnym osobistym temacie

03 — Dziennik — 5 prośb w 2 tygodnie

Cel: co najmniej 1 odrzucenie. To *nie* jest porażka — to *sukces*. Dowód, że odrzucenie się dzieje, a Ty je przeżywasz.

#	PROŚBA	POZIOM	REAKCJA ^{1-4 z} sekcji 01	CO POCZUŁEM/-AM PO
1				
2				
3				
4				
5				

04 ✱ Refleksja końcowa

ILE PROŚB PRZYNIOSŁO ODRZUCENIE

ILE ODRZUCENÍ BYŁO „KATASTROFĄ”, KTÓREJ SIĘ
BAŁEM/-AM

NOWE PRZEKONANIE O ODRZUCENIU

— jedno zdanie

Klucz: celem nie jest *nigdy* nie usłyszeć „nie” — celem jest **znormalizować** odrzucenie. Po 5 świadomych prośbach większość pacjentów raportuje: „odrzućenie wciąż mnie boli, ale boli 2-3 razy *mniej*, niż się spodziewałem/-am”. To wystarczy, by zacząć podejmować prośby, których wcześniej unikałeś/-aś — i otworzyć część życia społecznego zamkniętą strachem przed „nie” (Jiang 2017).